



Elenco dei prodotti notificati in virtù dell'art. 40b dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari¹

Stato: 08.05.2024

Sostanze di base contenute nel prodotto ²	Utilizzo	Nomi commerciali dei prodotti notificati	Produttore / importatore
Estratto d'ortica		Extrait fermenté d'ortie	Ville de Lausanne, Avenue du Chablais 46, 1023 Lausanne
		Purin d'ortie, Biortilia, Fortica, Biogarten Brennesseljauche, Orti-Bio, Ortimia - Pellet d'ortie	Ortica Sàrl, Rue des Artisans 20, 1088 Ropraz
		Ortical, Capito Brennessel-extrakt	Landi Schweiz AG, Schulriederstrasse 5, 3293 Dotzigen
		Ortiga	Leu + Gygax AG, Fellstrasse 1, 5413 Birnenstorf
		Estratto di ortica, Estratto di ortica pronto uso, Ortica	Caminada Sementi SA, Via al loco 15, 6814 Cadempino
		Kali-Cure	Westland Schweiz GmbH, Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf
		Urtibasic	Agribort Phyto SA, Route de l'usine 14, 1907 Saxon
		Gesal Brennessel-Extrakt	COMPO Jardin AG, Hegenheimermattweg 65, 4123 Allschwil
		Urtica	Ewia GmbH, Badenerstrasse 415, 8003 Zürich
		Estratto d'ortica, Equisetum arvense L.	
X-trait	Fontimpe Consultant Sàrl, Rue du Jura 21B, 1422 Grandson		
Idrossido di calcio	Utilizzo soltanto al di fuori del periodo vegetativo su frutta a granella e a nocciolo per la lotta contro i cancri.	Fruchtkalk	Kellerhals Beeren- und Obstkulturen, Kreuzfeldhof 21, 4414 Füllinsdorf
		Traitement de base Arbres fruitiers	Garden Center Schilliger SA, Route Suisse 40, 1196 Gland
		Nekagard 2	AGROLINE Bioprotect, Nordring 4, 4147 Aesch
Chitosano cloridrato	Utilizzo come fungicida e battericida per il trattamento delle sementi o per applicazione fogliare; dose max. 800 g a.i./ha	Sambesi	Leu + Gygax AG, Fellstrasse 1, 5413 Birnenstorf
		Carapax	AGROLINE Bioprotect, Nordring 4, 4147 Aesch
		Traitement de base Anti-maladies polyvalent	Garden Center Schilliger SA, Route Suisse 40, 1196 Gland
		Quitobasic	Agribort Phyto SA, Route de l'usine 14, 1907 Saxon
Chitosano cloridrato, Equisetum arvense L.	Utilizzo come fungicida e battericida per il trattamento delle sementi o per applicazione fogliare; dose max. 800 g a.i./ha Chitosano cloridrato	Capito Pilzstopp	Landi Schweiz AG, Schulriederstrasse 5, 3293 Dotzigen
Fosfato biammonico	Utilizzo come esca per trappole a bicchiere per la cattura di massa della mosca della ciliegia e della mosca dell'olivo	Fosfato diammonica	Caminada Sementi SA, Via al loco 15, 6814 Cadempino
Equisetum arvense L.		Arvento	AGROLINE Bioprotect, Nordring 4, 4147 Aesch
		Biogarten Decotto di equisetto, Equi-Bio, Equima - Pellet de prêle, Arvensia	Ortica Sàrl, Rue des Artisans 20, 1088 Ropraz
		Quiz	Leu + Gygax AG, Fellstrasse 1, 5413 Birnenstorf
		Gesal Schachtelhalm-Extrakt	COMPO Jardin AG, Hegenheimermattweg 65, 4123 Allschwil
		Silica-Cure	Westland Schweiz GmbH, Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf
		Equisetum arvense L	Caminada Sementi SA, Via al loco 15, 6814 Cadempino
		Equibasic	Agribort Phyto SA, Route de l'usine 14, 1907 Saxon
		Aceto	Utilizzo come esca per trappole a bicchiere per la cattura di massa, per la disinfezione delle sementi e delle cesoie. Utilizzo come erbicida in pre-emergenza; rischio di fitotossicità su giovani piante.
Déshebant Jardin	Garden Center Schilliger SA, Route Suisse 40, 1196 Gland		
Aceto Fix	Leu + Gygax AG, Fellstrasse 1, 5413 Birnenstorf		
Fruttosio	Utilizzo contro i vermi dei frutti del melo; dose max. 100 g/ha; max. 7 applicazioni all'anno. Utilizzo contro la cicalina della flavescenza dorata (Scafoideus titanus), stadi BBCH 17-57; max. 45 g/ha e anno. Utilizzo contro la peronospora della vite, stadi BBCH 10-57; max. 240g/ha e anno	Fructose 7099	AGROLINE Bioprotect, Nordring 4, 4147 Aesch
Lecitine	Utilizzo come fungicida secondo le indicazioni seguenti: - melo, oidio, stadi BBCH 03-79; dose max. 750 g a.i./ha; periodo d'attesa 5 giorni; - pesco, bolla del pesco, stadi BBCH 03-79; dose max. 750 g a.i./ha; periodo d'attesa 5 giorni; - uva spina, stadi BBCH 10-85; dose max. 2000 g a.i./ha; periodo d'attesa 5 giorni; - cetriolo, lattuga cappuccio, valerianella, pomodoro, cicoria belga, oidio, marciume delle foglie, alternaria, stadi BBCH 10-89; dose max. 2250 g a.i./ha; periodo d'attesa 5 giorni; - coltura ornamentale, stadi BBCH 10-89; dose max. 225 g a.i./ha; - vite, marcescenza e oidio, stadi BBCH 10-85; dose max. 225 g a.i./ha; periodo d'attesa 30 giorni; - fragola, lampone, malattie fungine, stadi BBCH 10-89; dose max. 1 kg a.i./ha; - patata, marciume, stadi BBCH 10-90; dose max. 800 g a.i./ha; - carota, oidio, stadi BBCH 19-90; dose max. 2 kg a.i./ha.	Elexo	AGROLINE Bioprotect, Nordring 4, 4147 Aesch
		Gesal Lecithin-Extrakt	COMPO Jardin AG, Hegenheimermattweg 65, 4123 Allschwil
		Traitement de base pour Arbres fruitiers	Garden Center Schilliger SA, Route Suisse 40, 1196 Gland
		Traitement de base pour Rosier	Garden Center Schilliger SA, Route Suisse 40, 1196 Gland
		Lecitina di soia	Caminada Sementi SA, Via al loco 15, 6814 Cadempino

Lecithine, Natriumhydrogencarbonat	Utilizzo come fungicida secondo le indicazioni seguenti: - melo, oidio, stadi BBCH 10-79; dose max. 750 g a.i./ha; periodo d'attesa 5 giorni; - cetriolo, lattuga cappuccio, valerianella, pomodoro, cicoria belga, oidio, marciume delle foglie, alternaria, stadi BBCH 12-89; dose max. 2250 g a.i./ha; periodo d'attesa 5 giorni; - coltura ornamentale, stadi BBCH 12-89; dose max. 225 g a.i./ha; - vite, marcescenza e oidio, stadi BBCH 12-85; dose max. 225 g a.i./ha; periodo d'attesa 30 giorni; - carota, oidio, stadi BBCH 19-89; dose max. 2 kg a.i./ha.	Traitement de base Plantes d'ornement	Garden Center Schilliger SA, Route Suisse 40, 1196 Gland
Siero (siero di latte)	Il siero non può essere utilizzato su parti commestibili di piante destinate all'alimentazione umana. L'utilizzo su uva da torchiare è consentito se sull'etichetta del vino da essa prodotto figurano le indicazioni di cui all'articolo 75 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle bevande.	Petit-lait - Lactosérum	Ortica Sàrl, Rue des Artisans 20, 1088 Ropraz
Idrogenocarbonato di sodio	Utilizzo come fungicida per le indicazioni seguenti: - verdura, piante ornamentali, viti, oidio, stadi BBCH 12-89; concentrazione max.: 1%; periodo d'attesa 1 giorno; - melo, ticchiolatura, stadi 10-85; concentrazione max. 1%; periodo d'attesa 1 giorno; - lotta contro le malattie nello stoccaggio di frutta, dopo il raccolto; max. 2 trattamenti; concentrazione max. 4%. - lotta contro i muschi nelle piante in vaso; max. 122 kg/ha; testarne dapprima la tollerabilità su poche piante.	Carbyc	Leu + Gygax AG, Fellstrasse 1, 5413 Birmenstorf
		Carbobasic	Agribort Phyto SA, Route de l'usine 14, 1907 Saxon
		Idrogeno carbonato di sodio, Muffa Stop Pronto Uso, Muffa Stop, Bicarbonato di sodio	Caminada Sementi SA, Via al loco 15, 6814 Cadempino
		Gesal Universal Pilzabwehr	COMPO Jardin AG, Hegenheimermattweg 65, 4123 Allschwil
		Funga	Omya (Schweiz) AG, Baslerstrasse 42, 4465 Oftringen
		Maladies légumes et fruits	Garden Center Schilliger SA, Route Suisse 40, 1196 Gland
		Baxoda	AGROLINE Bioprotect, Nordring 4, 4147 Aesch
Salix spp. cortex	Utilizzo come fungicida per le indicazioni seguenti: - melo, oidio, ticchiolatura, stadi BBCH 53-67; dose max. 2222 g a.i./ha; - pesco, bolla del pesco, stadi BBCH 10-57; dose max. 2222 g a.i./ha; - vite, marcescenza e oidio, stadi BBCH 10-57; dose max. 667 g a.i./ha.	Salixia	Ortica Sàrl, Rue des Artisans 20, 1088 Ropraz
		Salicor	AGROLINE Bioprotect, Nordring 4, 4147 Aesch
Olio di girasole	Utilizzo come fungicida su pomodoro contro l'oidio; stadi 32-71; concentrazione max. 0,5%; non trattare il fiore	Olio di girasole	Caminada Sementi SA, Via al loco 15, 6814 Cadempino
Talco (E553b)	Utilizzo come repellente per insetti e funghi su alberi da frutto a partire dallo stadio BBCH 41; dose max. 20 kg a.i./ha. Utilizzo come repellente per insetti e funghi in viticoltura a partire dallo stadio BBCH 20; dose max. 12.75 kg a.i./ha	Invelop F	Leu + Gygax AG, Fellstrasse 1, 5413 Birmenstorf
		Invelop F	Agribort Phyto SA, Route de l'usine 14, 1907 Saxon
Vino, aceto di sidro/di vino, zucchero	Utilizzo soltanto come esca per trappole a bicchiere per la cattura di massa	Becherfalle	RIGA AG, Schützenhausstrasse 7, 8548 Ellikon an der Thur
Olio di cipolla	Su ombrellifere contro la mosca della carota	Karma	Stähler Suisse SA, Henzmannstrasse 17A, 4800 Zofingen
		Psila Protect	Andermatt Biocontrol AG, Stahlermatten 6, 6146 Grossdietwil

Indicazioni concernenti l'elenco

In virtù dell'art. 45 OPF, il servizio d'omologazione pubblica l'elenco dei prodotti fitosanitari notificati contenenti esclusivamente sostanze di base autorizzate. Tali prodotti fitosanitari possono essere immessi sul mercato senza autorizzazione. Nel quadro di questa procedura di notifica, il servizio d'omologazione non verifica aspetti quali l'efficacia, gli effetti collaterali indesiderati, la stabilità della formulazione, eccetera. L'etichetta apposta sul prodotto deve recare l'indicazione "Prodotto fitosanitario ottenuto da sostanze di base (omologato senza prova dell'efficacia e della tolleranza vegetale)".

¹ RS 916.161 - Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, OPF

² Sostanze di base menzionate nell'allegato 1 parte D OPF (= autorizzate). Si applicano le specificazioni e condizioni menzionate in questo allegato.