



03/2013

---

## **Titel Deckinfektionen der Rinder: Bovine genitale Campylobacteriose**

**Die Infektion wird durch den Deckakt oder durch infektiösen Samen übertragen. Sie kann als Verursacher von Fruchtbarkeitsstörungen und Aborten beträchtliche wirtschaftliche Bedeutung haben.**

### **1 Empfängliche Arten**

Rind

### **2 Erreger**

Text *Campylobacter (C.) fetus*: bewegliche, gramnegative Bakterien. geringe Tenazität, kann jedoch in Stroh und Mist bis zu 30 Tagen überleben. Die Überlebenszeit in gefrorenem Samen beträgt mehrere Monate.

*C. fetus* wird in zwei Subspecies aufgeteilt: *C. fetus* subsp. *venerealis* als Erreger der klassischen, seuchenhaften Deckinfektion des Rindes (auszurottende Seuche) und *C. fetus* subsp. *fetus* als sporadischer Aborterreger beim Rind und Schaf. Im Gegensatz zu *C. fetus* subsp. *venerealis*, der als wirtsadaptierter Erreger gilt, ist *C. fetus* subsp. *fetus* ein opportunistischer Zoonoseerreger.

### **3 Klinik/Pathologie**

Gehäuftes Umrindern (embryonaler Frühtod), verlängerte Brunstintervalle, verlängerte Zwischenkalbezeiten, selten Frühabort. Aszendierende Infektion. Langsame Ausbreitung bis in die Eileiter. Verursacht subakute, eher leichte Metritis/Salpingitis. Selbstreinigung durch lokale Antikörperbildung. Beim Stier persistiert der Erreger in den Krypten der Präputialschleimhaut. Die Infektion ist symptomlos. Es werden keine lokalen Antikörper gebildet, die Stiere bleiben jahrelang Träger.

### **4 Verbreitung**

Der Erreger ist weltweit verbreitet, *C. fetus* subsp. *venerealis* wurde in der Schweiz bisher nicht festgestellt.

### **5 Epidemiologie**

Übertragung geschieht beim Deckakt oder mit infiziertem Samen, ist aber auch indirekt, von Stier zu Stier, mit kontaminierten Geräten, möglich (Hygiene bei der Samenentnahme).

### **6 Diagnose**

Verdacht bei gehäuftem Umrindern/Akonzeption, ev. in Verbindung mit Metritiden. Erregernachweis im Labor mittels Spezialnährmedien und Identifikation mittels PCR.

## **7 Differenzialdiagnosen**

Brucellose, Coxiellose, Leptospirose, Neosporose, Pilzaborte, IBR/IPV, Bovine Virusdiarrhöe/Mucosal Disease.

## **8 Immunprophylaxe**

In der Schweiz nicht zugelassen.

## **9 Untersuchungsmaterial**

Rind: Vaginal- und Cervixtupfer, Abortmaterial.

Stier: Präputialspülprobe in spezifischem Transportmedium.

## **10 Bekämpfung**

*C. fetus* subsp. *venerealis*: auszurottende Seuche, TSV Art. 128 – 131 und Art. 186-189. Stiere, die zur künstlichen Besamung eingesetzt werden, sind nach den Vorschriften des Bundesamtes für Veterinärwesen zu untersuchen (TSV Art. 187).

## **11 Fleischuntersuchung**

Beurteilung nach den allgemeinen Kriterien (VHyS, Anhang 7)