



Packungsbeilage Nr. 3726 / 2023

für Pflanzenschutzmittel gemäss Artikel 36 der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
(Pflanzenschutzmittelverordnung, SR 916.161).

Produkteigenschaften

Sachbezeichnung:	Fungizid
Formulierung:	WG Wasserdispergierbares Granulat
Wirkstoffgehalt:	70 % Metiram
IUPAC-Name:	zinc ammoniate ethylenebis(dithiocarbamate) - poly(ethylenethiuram disulfide)

Lagerung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist.

Entsorgung

Gebinde:	Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr.
Mittelreste:	Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Handelsprodukte

Polyram DF

Eidg. Zulassungsnummer: F-7271	Herkunftsland: Frankreich
Ausländische Zulassungsnummer: 8700107	Ausl. Bewilligungsinhaber: BASF Italia SpA, Italien

Polyram DF

Eidg. Zulassungsnummer: I-7270	Herkunftsland: Italien
Ausländische Zulassungsnummer: 7916	Ausl. Bewilligungsinhaber: BASF Italia SpA, Italien

Bewilligte Indikationen

Anwendungsgebiet	Schadereger/Wirkung	Anwendung unter Einhaltung von	(*)
Weinbau			
Reben	Falscher Mehltau der Rebe, Rotbrenner, Schwarzfäule der Rebe	Konzentration: 0,2 % Aufwandmenge: 3,2 kg/ha Wartefrist: 8 Woche(n) Anwendung: Vor- und Nachblütebehandlungen bis spätestens Mitte August.	1, 2, 3
Reben	Schwarzfleckenkrankheit der Rebe	Konzentration: 0,2 % Aufwandmenge: 1,6 kg/ha Anwendung: BBCH 7-10 (Stadium C-D), Vor der Blüte.	1, 2, 4
Feldbau			
Kartoffeln	Alternaria-Dürrfleckenkrankheit, Kraut- und Knollenfäule	Aufwandmenge: 3 kg/ha	2, 5, 6

Allgemeine / Agronomische Auflagen:

- 3 Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf Stadium BBCH 71-81 (J-M, Nachblüte) und eine Referenzbrühemenge von 1600 l/ha (Berechnungsgrundlage) oder auf ein Laubwandvolumen von 4500 m³ pro ha. Die Aufwandmenge ist gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle an das Laubwandvolumen anzupassen.
- 4 Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf Stadium BBCH 07-10 (C-D) und eine Referenzbrühemenge von 800 l/ha (Berechnungsgrundlage).
- 5 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.
- 6 Erste Behandlung wenn sich die Stauden in den Reihen berühren.

Anwenderschutz-Auflagen:

- 1 Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung des Mittels Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.
- 2 Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.

Auf der Packung aufzudruckende Gefahrenkennzeichnungen:**PSM-Sätze**

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.