



## **Sixième rapport sur la nutrition en Suisse – corrigendum**

### **Chapitre 2: page 83, figure 2.8. Part en pour cent des différents groupes d'aliments dans l'utilisation de vitamine B12.**

L'utilisation de vitamine B12 n'est pas couverte à 60 % par les céréales mais par la viande et les produits carnés.

La barre figurant dans l'illustration devrait être rouge (viande et produits carnés) et non pas marron (céréales).

### **Chapitre 3: page 152, tableau 3.5. Prévalence des facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires selon le sexe dans deux populations étudiées, 1993-2007.**

La prévalence indiquée à la ligne « Traitement de l'hypertension artérielle » de l'étude CoLaus (47,1 % chez les hommes, 53,8 % chez les femmes) ne se réfère pas à tous les hommes et toutes les femmes interrogés mais seulement à ceux qui ont indiqué souffrir d'hypertension.

Il faut lire : parmi les personnes interrogées, 20,2 % des hommes et 16,6 % des femmes sont traités pour l'hypertension.

### **Chapitre 3: page 166, estimation de la prévalence du diabète en 2030.**

La Fédération Internationale du Diabète (FID) a considérablement révisé ses pronostics. La déclaration selon laquelle la prévalence du diabète devrait, selon les estimations, être de 10 % en Suisse en 2030 chez les 20 à 79 ans, n'est donc plus correcte.

Il faut lire : L'incidence et la prévalence du diabète vont probablement continuer d'augmenter : on estime qu'en 2030, sa prévalence en Suisse devrait se situer autour de 8,7 % pour les personnes âgées de 20 à 79 ans (2011 : 7.4 %) (194).