Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

Blessures et soins apportés aux animaux

Toutes les catégories de volailles

*Ces diapositives contiennent toutes les informations nécessaires pour la formation des contrôleurs pour le point de contrôle **« Blessures et soins apportés aux animaux » pour toutes les catégories de volailles.** Ce document se base sur les Explications relatives aux points de contrôles du programme prioritaire 2021-2023 pour les volailles de chair et pour les poules pondeuses, poulettes et animaux reproducteurs.*

Veuillez tenir compte chaque fois des commentaires sur les diapositives dans la page de notes. Vous y trouverez de plus amples informations et des aides.

Blessures et soins apportés aux animaux

Les exigences sont remplies lorsque :	Questions pour le contrôle
– Les animaux malades et/ou blessés sont hébergés, traités et soignés de manière appropriée, ou mis à mort correctement.	*Certains animaux sont-ils manifestement malades ou blessés ?* *Comment les animaux sont-ils mis à mort ?* *Existe-t-il une infirmerie ?*
– La personne qui met à mort les animaux est compétente.	*À quelle fréquence les contrôles avec des rondes dans tout le poulailler sont-ils réalisés ?*

Extrait explications

La colonne «les exigences sont remplies lorsque» contient les critères qui sont à contrôler.

La colonne «questions pour le contrôle» contient des questions destinées au contrôle de la plausibilité.

Soins / Infirmerie

- Les animaux blessés ou malades peuvent être séparés du troupeau pour les soigner (infirmerie)
  - Doit être possible pour les dindes
- Lorsqu'un traitement est inenvisageable pour des raisons économiques (par exemple poulets de chair à croissance rapide), **les animaux malades ou blessés doivent être mis à mort immédiatement.**

Pour les dindes, une infirmerie doit soit être présente ou il doit être possible d'expliquer comment elle peut être montée si nécessaire.

Si une infirmerie est installée, toutes les exigences minimales de l'OPAn doivent être remplies, par exemple, pour les poules pondeuses un pondoir, de la litière et des perchoirs doivent être présent.

Si l'état des animaux soignés ne s'améliore pas, ils doivent être tués correctement et immédiatement.

Mise à mort correcte

- Le détenteur doit expliquer la méthode de mise à mort utilisée et montrer les instruments utilisés
- S'il y a un animal à mettre à mort le jour du contrôle, il peut être mis à mort directement durant le contrôle.
- Principes de base:
  1. Étourdissement
  2. Mise à mort

  ➢ Pas d'étourdissement = manquement

La fiche thématique de protection des animaux n° 16.1 « Mise à mort correcte des volailles, des pigeons et des cailles » contient des informations détaillées sur la mise à mort, y compris sur les méthodes de mise à mort correctes et les exigences requises pour les personnes chargées de mettre à mort les animaux.

Méthodes de mise à mort pour les volailles

Méthode de mise à mort	conforme à la protection des animaux pour ...
Euthanasie par un vétérinaire	tous les animaux
Coup sur la tête et dislocation cervicale manuelle	volailles jusqu'à 5 kg, pigeons et cailles
Coup sur la tête et dislocation cervicale mécanique avec la pince à tuer	volailles jusqu'à 10 kg, pigeons et cailles
Coup sur la tête et décapitation	volailles jusqu'à 10 kg, pigeons et cailles
Percussion avec un pistolet non perforant et dislocation cervicale manuelle	volaill
Percussion avec un pistolet non perforant et dislocation cervicale mécanique avec la pince à tuer	volaill
Percussion avec un pistolet non perforant et décapitation	volailles

Pour étourdir les dindes lourdes, un pistolet à tige perforante peut aussi être utilisé

Méthodes de mise à mort conformes à la protection des animaux pour les volailles. Cette liste n'est pas exhaustive. Un étourdissement à l'aide d'un pistolet à tige perforante est également approprié pour les dindes.

Un coup ciblé et suffisamment puissant sur la tête peut être utilisé pour étourdir les volailles jusqu’à 10 kg. Le coup doit être porté avec un objet dur, non tranchant, et adapté à la taille de l’animal.

Mise à mort

- L'animal doit être mis à mort immédiatement après l'étourdissement.

Photos : Aviforum

La méthode de mise à mort la plus commune chez la volaille est la dislocation cervicale.

Photo de gauche: dislocation cervicale manuelle - la dislocation cervicale manuelle ne convient que pour les animaux jusqu'à 5 kg.

Photo de droite: dislocation cervical mécanique - la pince utilisée doit être prévue à cet effet et être adaptée à la taille de l'animal.

Vérification dislocation cervicale



Bader et al., 2014

La dislocation cervicale doit faire l'objet d'un contrôle : il faut pouvoir palper un espace de la largeur d'au moins un doigt entre les os à l'endroit de la dislocation.

Image: Radiographie d'une dinde de 3 kg après une dislocation cervicale. Reference: Bader et al., 2014, Anatomical and histological pathology induced by cervical dislocation following blunt head trauma for on-farm euthanasia of poultry, Journal of Applied Poultry Research, 23-3, 546-556, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1056617119304192

Questions?

Dans la présentation, ces diapositives marquent chaque fois la fin d'un chapitre thématique. Elles sont destinées à traiter les questions de manière groupée.

Blessures et soins apportés aux animaux

Les exigences sont remplies lorsque :	Questions pour le contrôle
– Les animaux malades et/ou blessés sont hébergés, traités et soignés de manière appropriée, ou mis à mort correctement.	*Certains animaux sont-ils manifestement malades ou blessés ?* *Comment les animaux sont-ils mis à mort ?* *Existe-t-il une infirmerie ?*
– La personne qui met à mort les animaux est compétente.	*À quelle fréquence les contrôles avec des rondes dans tout le poulailler sont-ils réalisés ?*

*** Les animaux qui boitent visiblement ou qui sont incapables de se déplacer sont à compter**

Extrait explications

La colonne «les exigences sont remplies lorsque» contient les critères qui sont à contrôler.

La colonne «questions pour le contrôle» contient des questions destinées au contrôle de la plausibilité.

Animaux qui boitent visiblement ou incapables de se déplacer

Indicateur	Définition
visiblement boiteux ou incapable de se déplacer	L'animal s'éloigne de la personne qui marche, mais se couche à nouveau après 2 ou 3 pas. ou L'animal ne se déplace pas lorsqu'on s'approche ou après avoir été doucement touché.



Lors de l'aller-retour dans le poulailler (par exemple en même temps que pour prendre les mesures de concentration d'ammoniac), les animaux qui boitent visiblement ou qui sont incapables de se déplacer sont à compter.

Cette méthode donne une bonne indication de la situation dans le poulailler même si pas tous les animaux qui boitent dans le troupeau sont enregistrés.

Vidéo de gauche: les poulets sur cette vidéo ne boitent pas

Vidéo de droite: un animal est incapable de se déplacer, il essaie de s’éloigner de la personne qui s’approche mais n’en ai pas capable.

Calcul

Le nombre d'animaux visiblement boiteux ou incapable de se déplacer comptés est mis en relation avec le nombre total d'animaux dans le poulailler:

$$\frac{\text{Nombre d'animaux qui boitent visiblement ou sont incapable de se mouvoir}}{\text{nombre d'animaux dans le poulailler}} \times 100\ \%$$

- Si le résultat dépasse 0.1 %, c'est à considérer comme un manquement

Exemple de calcul

Troupeau avec 5000 poulets le jour du contrôle

- En traversant le poulailler on compte 2 poulets qui boitent clairement et 1 poulet incapable de se délacer
  - Calcul: (3/5000) x 100 % = 0.06 %

➢ Pas de manquement

Questions?

Dans la présentation, ces diapositives marquent chaque fois la fin d'un chapitre thématique. Elles sont destinées à traiter les questions de manière groupée.

Possibilités d'occupation - poules pondeuses, jeunes poules, parentales

Les exigences sont remplies lorsque :	Questions pour le contrôle
– pour éviter le picage des plumes et des orteils ainsi que le cannibalisme, des possibilités d'occupation supplémentaires sont mises à disposition des animaux	*Y a-t-il du matériel d'occupation à disposition (p. ex. pierre à picorer, filets remplis de foin, bottes de paille)?* *Y a-t-il des animaux présentant des blessures dues au picage ?*

Extrait explications

Des possibilités d'occupation doivent être disponible à titre préventif pour poules pondeuses, poulettes et parentales.

Photos: des bottes de paille, des récipients avec du sable ou du gravier, des filets remplis de foin, des blocs de picage (Y-tong) et la distribution de graines dans la litière sont des exemples de possibilités d'occupation.

Blessures chez les pondeuses, les poulettes et les parentaux

- Le picage de plumes, le picage des orteils et d'autres comportements anormaux peuvent apparaître dans le troupeau.
- Quelles mesures ont été prises?

➢ Manquement: aucune mesure n'a été prise



En cas de d'apparition de picage de plume ou d'orteils, des mesures doivent avoir été prises. Des exemples de mesures sont des possibilités d'occupation supplémentaires, le traitement des orteils blessés, une consultation vétérinaire.

Photo: posture typique d'une poule pondeuse blessée à une patte – probablement dû au picage d'orteil.

Questions?

Dans la présentation, ces diapositives marquent chaque fois la fin d'un chapitre thématique. Elles sont destinées à traiter les questions de manière groupée.

Mortalité chez les pondeuses, les poulettes, les parentaux

Les exigences sont remplies lorsque :	Questions pour le contrôle
– des mesures sont prises si le taux de mortalité est de plus de 1 % sur 4 semaines.	*La mortalité est-elle consignée ?* *Des mesures raisonnables et efficaces ont-elles été prises ?* *Qui a été contacté ?*

Extrait explications

Mortalité chez les volailles de chair

Les exigences sont remplies lorsque :	Questions pour le contrôle
– des mesures sont prises si le taux de mortalité est de plus de 3 %.	*La mortalité est-elle consignée ?* *Des mesures raisonnables et efficaces ont-elles été prises ?* *Qui a été contacté ?*

Extrait explications

Mortalité

- Le taux de mortalité en % est calculé de la manière suivante :

$$\frac{\text{Nombre d'animaux morts depuis la mise au poulailler}}{\text{Nombre d'animaux mis au poulailler}} \times 100$$

- Le taux de mortalité comprend les animaux qui ont été trouvés morts dans le poulailler et les animaux qui ont été mis à mort pour abréger leurs souffrances.

- Les animaux qui ont été trouvés morts ou ont été mis à mort durant le transport ou à l'abattoir n'entrent pas dans ce calcul.

Mortalité

- Si des mesures appropriées et efficaces ont été prises et que celles-ci sont documentées, aucune manquement n'est a enregistré, même si le taux de mortalité est supérieur au seuil.
  - Exemples de mesures appropriées: Consultation vétérinaire, adaptation de la ventilation en cas de stress thermique, etc.

➢ Manquement: si le taux de mortalité est supérieur au seuil <u>et</u> aucune mesure n'a été prise

Exception jeunes poules

- La mortalité durant les 4 premières semaines de vie des poulettes est en général supérieure à 1 %, même avec des conditions de détention et des pratiques de gestion optimales.

Questions?

Dans la présentation, ces diapositives marquent chaque fois la fin d'un chapitre thématique. Elles sont destinées à traiter les questions de manière groupée.