



Notice d'emploi N° 6346 / 2019

Pour les produits phytosanitaires visés à l'art. 36 de l'ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(ordonnance sur les produits phytosanitaires, RS 916.161)

Caractéristiques du produit

Dénomination spécifique:	Fongicide
Formulation:	EC concentré émulsifiable
Teneur en substances actives:	22.7 % propiconazole (250 g/l); 22.7 % difénoconazole (250 g/l)
Nom UICPA:	(±)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole; cis,trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether

Stockage

Le produit doit être conservé dans l'emballage original, à l'écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des médicaments, de façon à ne pas être accessible aux personnes non autorisées.

Elimination

Emballage:	Les récipients vides, nettoyés avec soin, doivent être confiés à la voirie pour leur élimination.
Restes de produits phytosanitaires:	Les restes de produits phytosanitaires doivent être confiés au centre de ramassage de la commune, à un centre de collecte de déchets spéciaux ou au point de vente.

Produits commerciaux

Difénoconazol + Propiconazol

Numéro d'homologation fédéral: D-6274	Pays d'origine: Allemagne
Numéro d'homologation étranger: GP 024111-00/008	Titulaire de l'autorisation étranger: Bernbeck LLP, Royaume-Uni

Taspa

Numéro d'homologation fédéral: D-5293	Pays d'origine: Allemagne
Numéro d'homologation étranger: 024111-00	Titulaire de l'autorisation étranger: Syngenta Agro GmbH, Allemagne

Indications autorisées

Domaine d'application	Ravageur	Spécifications d'application	(*)
Grande culture			
Blé	rouille brune	Dosage: 0.5 l/ha Application: stade 37-61 (BBCH).	1, 2
Blé	rouille jaune	Dosage: 0.5 l/ha Application: stade 31-61 (BBCH).	1, 2
Blé	septorioses foliaires (S. tritici ou S. nodorum)	Dosage: 0.5 l/ha Application: stade 37-61 (BBCH).	1, 2, 3, 4
Blé	oïdium des céréales	Dosage: 0.5 l/ha Application: stade 31-61 (BBCH).	1, 2
Blé	septoriose de l'épi (S. nodorum)	Dosage: 0.5 l/ha Application: stade 37-61 (BBCH).	1, 2, 3
Blé	grillures (PLS)	Dosage: 0.5 l/ha Application: stade 37-61 (BBCH).	1, 2, 4, 5

Seigle	rouille brune	Dosage: 0.5 l/ha Application: stade 37-61 (BBCH).	1, 2
betteraves à sucre et fourragère	cercosporiose et ramulariose, oïdium des betteraves, rouille des betteraves	Dosage: 0.5 l/ha Délai d'attente: 3 Semaine(s)	2, 6

Charges générales / agronomiques:

- 1 1 traitement au maximum.
- 3 Dans les zones présentant un risque de septoriose et pour les variétés sensibles.
- 4 En mélange avec Bravo 500 (1.5 l/ha).
- 5 Dès l'apparition des premiers symptômes sur les 3 dernières feuilles.
- 6 2 traitements par parcelle et par année au maximum.

Protection des utilisateurs:

- 2 Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection + des lunettes de protection ou une visière.

Indications relatives à la sécurité devant figurer sur l'emballage:

Phrases PPS

- Tenir hors de portée des enfants.
- SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.