



### Grande culture

Colza	méligèthe des crucifères	Dosage: 0.15 kg/ha Application: au stade bourgeon, avant la floraison.	1, 4
Féverole	pucerons du feuillage	Dosage: 0.4 kg/ha Délai d'attente: 2 Semaine(s)	1
Houblon	puceron vert du houblon	Concentration: 0.025 % Délai d'attente: 3 Semaine(s)	1
Tabac	pucerons du feuillage	Dosage: 0.6 kg/ha	1
pommes de terre de consommation et fourragère	pucerons du feuillage	Dosage: 0.3 kg/ha Délai d'attente: 3 Semaine(s)	1
pommes de terre pour la production de plants	Pucerons vecteurs de virus	Dosage: 0.3 kg/ha	1, 5
<b>Culture ornementale</b>			
serre: toutes les cultures	mouches blanches	Concentration: 0.06 %	1
toutes les cultures	pucerons du feuillage	Concentration: 0.04 %	1

---

### Charges générales / agronomiques:

- 2 Autorisé comme utilisation mineure selon l'art. 35 OPPh (minor use).
- 3 3 traitements au maximum par parcelle et par année à des intervalles de 10-14 jours.
- 4 1 traitement par culture au maximum.
- 5 Seulement dans des cultures sous tunnel ou sous serre

### Protection des utilisateurs:

- 1 Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection + une tenue de protection.

### Indications relatives à la sécurité devant figurer sur l'emballage:

#### Phrases PPS

- Tenir hors de portée des enfants.
- SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.