

Décision de portée générale concernant l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans des cas particuliers

du 9 décembre 2021

L'Office fédéral de l'agriculture,

vu l'art. 40 de l'ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires¹,
décide:

Les produits phytosanitaires

BIOHOP SprayOIL (W-2008-1, 830 g/l huile de paraffine)

Biorga Contra Winteröl (W-1526-2, 830 g/l huile de paraffine)

Capito Winterspritzmittel (W-1526-1, 830 g/l huile de paraffine)

Misto 12 (W-1454, 830 g/l huile de paraffine)

Oleoc, (W-1454-1, 830 g/l huile de paraffine)

Oléoc (W-1529, 830 g/l huile de paraffine)

Ovitex (W-7120, 817g/l huile de paraffine)

Parafol (W-1454-2, 830 g/l huile de paraffine)

Spray Oil 7-E (W-2008, 830 g/l huile de paraffine)

Weissöl (W- 7482, 830 g/l huile de paraffine)

Weissöl / Huile blanche / Olio bianco (W-2215, 830 g/l huile de paraffine)

Weissöl S (W- 4555, 830 g/l huile de paraffine)

Zofal D (W- 1526, 830 g/l huile de paraffine)

sont autorisés temporairement jusqu'au 31 octobre 2022 pour une utilisation limitée,
liée aux conditions suivantes:

¹ RS 916.161

Applications autorisées:

Domaine d'application	Organisme nuisible	Mode d'application	Charges
Arboriculture			
Pommier	<i>Pseudococcus</i>	Concentration: 1 %	1, 2, 3, 4
Poirier/Nashi	<i>comstocki</i>	Dosage: 16 l/ha	
Prunier (pruneau/prune)		Application: après la floraison	

Charges à respecter au moment de l'utilisation

- 1 Les produits n'ont pas été testés dans les conditions pratiques suisses contre le *Pseudococcus comstocki*; l'efficacité et l'absence de phytotoxicité ne peuvent donc pas être garanties.
- 2 Un traitement après la floraison sur instruction des services phytosanitaires cantonaux.
- 3 Traitement à un intervalle d'au moins une semaine des traitements précédant et suivant effectués avec d'autres produits.
- 4 Le dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10 000 m³ par ha.

Le produit phytosanitaire
Movento SC (W 6742, 100 g/l Spirotetramat)

est autorisés temporairement jusqu'au 31 octobre 2022 pour une utilisation limitée, liée aux conditions suivantes:

Applications autorisées:

Domaine d'application	Organisme nuisible	Mode d'application	Charges
Arboriculture			
Pommier,	<i>Pseudococcus</i>	Concentration: : 0.09 %	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Poirier/Nashi	<i>comstocki</i>	Dosage: 1,44 l/ha	9, 10
Abricotier		Délai d'attente: 3 semaines	
Prunier (pruneau/prune)		Application: à partir de la postfloraison (BBCH 69)	

Charges à respecter au moment de l'utilisation

- 1 Les produits n'ont pas été testés dans les conditions pratiques suisses contre le *Pseudococcus comstocki*; l'efficacité ne peut donc pas être garantie.
- 2 Traitement contre le *Pseudococcus comstocki* seulement sur instruction des services phytosanitaires cantonaux.
- 3 Le dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10 000 m³ par ha.
- 4 SPa1: Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit contre le *Pseudococcus comstocki* plus d'une fois par année et parcelle.
- 5 Maximum 2 traitements au total par année et parcelle avec ce produit.
- 6 Ne pas appliquer en mélange en cuve avec d'autres produits.
- 7 Pas de traitements avec d'autres produits entre 3 jours avant et 3 jours après le traitement avec Movento SC.
- 8 Appliquer à des températures moyennes.
- 9 Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection + une tenue de protection. Application de la bouillie: Porter des gants de protection + une tenue de protection + un couvre-chef. Les équipements techniques utilisés lors de l'application (p. ex. cabine de tracteur fermée) peuvent remplacer les équipements personnels de protection s'ils offrent de manière avérée une protection semblable ou supérieure.
- 10 Travaux successifs: porter des gants de protection + une tenue de protection (au minimum une chemise à manches longues + des pantalons).

Les produits phytosanitaires

Gazelle SG (W 6581, 20 % Acetamiprid)

Basudin SG (W 6581-1, 20 % Acetamiprid)

Barritus Rex (W 6581-2, 20 % Acetamiprid)

Oryx Pro (W 6581-3, 20 % Acetamiprid)

Pistol (W 6581-4, 20 % Acetamiprid)

sont autorisés temporairement jusqu'au 31 octobre 2022 pour une utilisation limitée, liée aux conditions suivantes:

Applications autorisées:

Domaine d'application	Organisme nuisible	Mode d'application	Charges
Arboriculture			
Pommier,	<i>Pseudococcus</i>	Concentration: 0,015 %	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Poirier/Nashi	<i>comstocki</i>	Dosage: 0,24 kg/ha	
Abricotier		Délai d'attente: 3 semaines	
Prunier (pruneau/prune)		Application: à partir de la postfloraison (BBCH 69)	

Charges à respecter au moment de l'utilisation

- 1 Les produits n'ont pas été testés dans les conditions pratiques suisses contre *le Pseudococcus comstocki*; l'efficacité ne peut donc pas être garantie.
- 2 Traitement contre le *Pseudococcus comstocki* seulement sur instruction des services phytosanitaires cantonaux.
- 3 Le dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10 000 m³ par ha.
- 4 SPa 1: Pour éviter le développement de résistances 1 traitement au maximum par parcelle et par année contre le *Pseudococcus comstocki*. Maximum 2 traitements au total par parcelle et par année avec des produits du même groupe de matières actives.
- 5 SPe 3: Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 20 m par rapport aux eaux de surface. Pour protéger des conséquences liées au ruissellement, respecter une zone tampon enherbée sur toute la surface de 6 m par rapport aux eaux de surface. La réduction de la zone liée à la dérive et les dérogations sont fixées dans les instructions de l'OFAG.
- 6 Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection + une tenue de protection. Application de la bouillie: Porter des gants de protection + une tenue de protection. Les équipements techniques utilisés lors de l'application (p. ex. cabine de tracteur fermée) peuvent remplacer les équipements personnels de protection s'ils offrent de manière avérée une protection semblable ou supérieure.
- 7 Travaux successifs: porter des gants de protection + une tenue de protection (au minimum une chemise à manches longues + des pantalons).

Retrait de l'effet suspensif

Un éventuel recours contre la présente décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif en vertu de l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative².

Voies de droit

La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

09.12.2021

Office fédéral de l'agriculture

Le directeur, Christian Hofer

² RS 172.021