



Liste des produits annoncés conformément à l'art. 40b de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires¹

Etat: 14.11.2023

Substances de base contenues ²	Utilisation	Noms commerciaux des produits au	Producteur / importateur		
Extrait d'ortie		Extrait fermenté d'ortie	Ville de Lausanne, Avenue du Chablais 46, 1023 Lausanne		
		Purin d'ortie, Biortilia, Fortica, Biogarten Brennesseljauche, Orti-Bio, Ortimia - pellet d'ortie	Ortica Sàrl, Rue des Artisans 20, 1088 Ropraz		
		Ortical, Capito Brennessel-extrakt	AGROLINE Bioprotect, Nordring 4, 4147 Aesch		
		Ortiga	Leu + Gygax AG, Fellstrasse 1, 5413 Birmenstorf		
		Estratto di ortica, Estratto di ortica pronto uso, Ortica	Caminada Sementi SA, Via al loco 15, 6814 Cadempino		
		Kali-Cure	Westland Schweiz GmbH, Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf		
		Urtibasic	Agribort Phyto SA, Route de l'usine 14, 1907 Saxon		
		Gesal Brennessel-Extrakt	COMPO Jardin AG, Hegenheimermattweg 65, 4123 Allschwil		
		Extrait d'ortie, Equisetum arvense L.		BIOHOP EquiSET	Renovita Wilen GmbH, Weidstrasse 11, 9500 Wil
				X-trait	Fontimpe Consultant Sàrl, Rue du Jura 21B, 1422 Grandson
Hydroxyde de calcium	Utilisation seulement en dehors de la période de végétation sur fruits à pépins et à noyau pour lutter contre les chancre.	Fruchtkalk	Kellerhals Beeren- und Obstkulturen, Kreuzfeldhof 21, 4414 Füllinsdorf		
		Traitement de base Arbres fruitiers	Garden Center Schilliger SA, Route Suisse 40, 1196 Gland		
		Nekagard 2	AGROLINE Bioprotect, Nordring 4, 4147 Aesch		
Chlorhydrate de chitosane	Utilisation comme fongicide et bactéricide pour le traitement des semences ou pour application foliaire; dose max. 800 g a.i./ha	Sambesi	Leu + Gygax AG, Fellstrasse 1, 5413 Birmenstorf		
		Carapax	AGROLINE Bioprotect, Nordring 4, 4147 Aesch		
		Traitement de base Anti-maladies polyvalent	Garden Center Schilliger SA, Route Suisse 40, 1196 Gland		
Chlorhydrate de chitosane, Equisetum arvense L.	Utilisation comme fongicide et bactéricide pour le traitement des semences ou pour application foliaire; dose max. 800 g a.i./ha Chlorhydrate de chitosane	Quitobasic	Agribort Phyto SA, Route de l'usine 14, 1907 Saxon		
		Capito Pilzstopp	Landi Schweiz AG, Schulriederstrasse 5, 3293 Dotzigen		
Phosphate diammonique	Utilisation comme attractif pour le piégeage de masse de la mouche de la cerise et de la mouche de l'olive	Fosfato diammonica	Caminada Sementi SA, Via al loco 15, 6814 Cadempino		
Equisetum arvense L.		Arvento	AGROLINE Bioprotect, Nordring 4, 4147 Aesch		
		Biogarten Décoction de prêle, Equi-Bio, Equima - pellet de prêle, Arvensia	Ortica Sàrl, Rue des Artisans 20, 1088 Ropraz		
		Quiz	Leu + Gygax AG, Fellstrasse 1, 5413 Birmenstorf		
		Gesal Schachtelhalm-Extrakt	COMPO Jardin AG, Hegenheimermattweg 65, 4123 Allschwil		
		Silica-Cure	Westland Schweiz GmbH, Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf		
		Equisetum arvense L	Caminada Sementi SA, Via al loco 15, 6814 Cadempino		
		Equibasic	Agribort Phyto SA, Route de l'usine 14, 1907 Saxon		
		Vinaigre	Utilisation comme attractif pour le piégeage de masse, pour la désinfection des semences, pour la désinfection des instruments de taille. Utilisation comme herbicide en prélevée; risque de phytotoxicité sur jeunes plantes.	Vinaigre	Ortica Sàrl, Rue des Artisans 20, 1088 Ropraz
Désherbant Jardin	Garden Center Schilliger SA, Route Suisse 40, 1196 Gland				
Aceto Fix	Leu + Gygax AG, Fellstrasse 1, 5413 Birmenstorf				
Fructose	Utilisation contre les vers des fruits du pommier; dose max. 100 g/ha; max. 7 applications par année. Utilisation contre la cicadelle de la vigne (Scaphoideus titanus), stade BBCH 17 à 57; max. 45 g/ha et par année. Utilisation contre le mildiou dans la vigne, stade BBCH 10 à 57; max. 240 g/ha et par année	Fructose 7099	AGROLINE Bioprotect, Nordring 4, 4147 Aesch		
Lécithines	Utilisation comme fongicide selon les indications suivantes: - pommier, oïdium, stades BBCH 03 à 79; dose max. 750 g a.i./ha; délai d'attente 5 jours; - pêcher, cloque du pêcher, stades BBCH 03 à 79; dose max. 750 g a.i./ha; délai d'attente 5 jours; - groseilles à maquereau, stades BBCH 10 à 85; dose max. 2000 g a.i./ha; délai d'attente 5 jours; - concombre, laitues pommées, mâche, tomate, chicorée-witloof, oïdium, mildiou, Alternaria, stades BBCH 10 à 89; dose max. 2250 g a.i./ha; délai d'attente 5 jours; - culture ornementale, stades BBCH 10 à 89; dose max. 225 g a.i./ha; - vigne, mildiou, oïdium, stades BBCH 10 à 85; dose max. 225 g a.i./ha; délai d'attente 30 jours; - fraises, framboises, maladies fongiques, stade BBCH 10 à 89; dose max. 1 kg a.i./ha; - pommes de terre, mildiou, stade BBCH 10 à 90; dose max. 800 g a.i./ha; - carottes, oïdium, stade BBCH 19 à 90; dose max. 2 kg a.i./ha	Elexo	AGROLINE Bioprotect, Nordring 4, 4147 Aesch		
		Gesal Lecithin-Extrakt	COMPO Jardin AG, Hegenheimermattweg 65, 4123 Allschwil		
		Traitement de base pour Arbres fruitiers	Garden Center Schilliger SA, Route Suisse 40, 1196 Gland		
		Traitement de base pour Rosier	Garden Center Schilliger SA, Route Suisse 40, 1196 Gland		
		Lecitina di soia	Caminada Sementi SA, Via al loco 15, 6814 Cadempino		

Lécithines, Hydrogénocarbonate de sodium	Utilisation comme fongicide selon les indications suivantes: – pommier, oïdium, stades BBCH 10 à 79; dose max. 750 g a.i./ha; délai d'attente 5 jours; – concombre, laitues pommées, mâche, tomate, chicorée-witloof, oïdium, mildiou, Alternaria, stades BBCH 12 à 89; dose max. 2250 g a.i./ha; délai d'attente 5 jours; – culture ornementale, stades BBCH 12 à 89; dose max. 225 g a.i./ha; – vigne, mildiou, oïdium, stades BBCH 12 à 85; dose max. 225 g a.i./ha; délai d'attente 30 jours; – carottes, oïdium, stade BBCH 19 à 89; dose max. 2 kg a.i./ha	Traitement de base Plantes d'ornement	Garden Center Schilliger SA, Route Suisse 40, 1196 Gland
Petit-lait (lactosérum)	Il ne doit pas être appliqué sur les parties comestibles des plantes destinées à la consommation humaine. Une utilisation sur des raisins de cuve est autorisée à condition que l'étiquette du vin produit porte les informations visées à l'art. 75, al. 1, let. e, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons.	Petit-lait - Lactosérum	Ortica Sàrl, Rue des Artisans 20, 1088 Ropraz
Hydrogénocarbonate de sodium	Utilisation comme fongicide pour les indications suivantes: – légumes, plantes ornementales, vigne, oïdium, stades BBCH 12 à 89; concentration max. 1 %; délai d'attente 1 jour; – pommier, tavelure, stades 10 à 85; concentration max. 1 %; délai d'attente 1 jour; – lutte contre les maladies de stockage des fruits, après la récolte; au max. 2 traitements, concentration max. 4 %. – Lutte contre les mousses dans les plantes en pots, max. 122 kg/ha; tester au préalable la comptabilité sur un petit nombre de plantes	Carbyc	Leu + Gygax AG, Fellstrasse 1, 5413 Birmenstorf
		Carbobasic	Agribort Phyto SA, Route de l'usine 14, 1907 Saxon
		Idrogeno carbonato di sodio, Muffa Stop Pronto Uso, Muffa Stop, Bicarbonato di sodio	Caminada Sementi SA, Via al loco 15, 6814 Cadempino
		Gesal Universal Pilzabwehr	COMPO Jardin AG, Hegenheimermattweg 65, 4123 Allschwil
		Funga	Omya (Schweiz) AG, Baslerstrasse 42, 4465 Oftringen
		Maladies légumes et fruits	Garden Center Schilliger SA, Route Suisse 40, 1196 Gland
		Baxoda	AGROLINE Bioprotect, Nordring 4, 4147 Aesch
		Salix spp. cortex	Utilisation comme fongicide pour les indications suivantes: -pommier, oïdium, stades BBCH 53 à 67; dose max. 2222 g a.i./ha; -pêcher, cloque du pêcher, stades BBCH 10 à 57; dose max. 2222 g a.i./ha; -vigne, mildiou, oïdium, stades BBCH 10 à 57; dose max. 667 g a.i./ha.
Huile de tournesol	Utilisation comme fongicide sur tomate contre l'oïdium, stades 32 à 71; concentration max. 0,5 %; ne pas traiter sur la fleur	Olio di girasole	Caminada Sementi SA, Via al loco 15, 6814 Cadempino
Talc E553B	Utilisation comme insectifuge et comme fongifuge sur les arbres fruitiers à partir du stade BBCH 41; dose max. 20 kg a.i./ha. Utilisation comme insectifuge et comme fongifuge en viticulture à partir du stade BBCH 20; dose max. 12,75 kg a.i./ha	Invelop F Invelop F	Leu + Gygax AG, Fellstrasse 1, 5413 Birmenstorf Agribort Phyto SA, Route de l'usine 14, 1907 Saxon
Vin, vinaigre de fruits/de vin, sucre	Utilisation seulement comme attractif pour le piégeage de masse	Becherfalle	RIGA AG, Schützenhausstrasse 7, 8548 Ellikon an der Thur
Huile d'oignon	Sur les ombellifères contre la mouche de la carotte	Karma Psila Protect	Stähler Suisse SA, Henzmannstrasse 17A, 4800 Zofingen Andermatt Biocontrol AG, Stahlermatten 6, 6146 Grossdietwil

Remarques sur la liste:

Conformément à l'art. 45 OPPh, le service d'homologation publie la liste des produits phytosanitaires annoncés qui contiennent exclusivement des substances de base approuvées. Ces produits phytosanitaires peuvent être mis en circulation sans autorisation. Dans le cadre de cette procédure d'annonce, le service d'homologation n'examine pas les points tels que l'efficacité, les effets secondaires indésirables, la stabilité de la formulation, etc. L'indication «Produit phytosanitaire consistant en substances de base (homologué sans preuve d'efficacité ni de phytotoxicité pour les plantes)» doit figurer sur

¹ RS 916.161 - Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires, OPPh

² Substances de base figurant à l'annexe 1, partie D, de l'OPPh (= approuvées). Les spécifications et conditions précisées dans cette annexe doivent être respectées.