




Promemoria sulla sorveglianza ufficiale degli aborti negli animali a unghia fessa


Novembre 2021


Questo promemoria si rivolge ai veterinari in attività e illustra i principi più importanti della sorveglianza ufficiale degli aborti ai sensi dell'articolo 129 dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE).

Obbligo di notifica del detentore di animali	Ai sensi dell'articolo 129 capoverso 3 OFE, il detentore di animali è tenuto a notificare al suo veterinario dell'effettivo tutti gli aborti degli animali a unghia fessa Richiamate l'attenzione dei vostri clienti su tale obbligo!	
Obbligo di analisi	Specie animale:	bovini e altri animali della famiglia dei bovidi (bufali, bisonti), ovini, caprini e suini
	Quando:	se nell'effettivo gli aborti sono più frequenti, ma almeno in caso di un secondo aborto in 4 mesi; Nelle stalle dei commercianti e nelle estivazioni: tutti gli aborti.
Assunzione dei costi	Le analisi prescritte sono pagate dal servizio veterinario cantonale; ulteriori analisi sono a carico del detentore di animali, a meno che non siano state espressamente concordate in anticipo con il Cantone.	
Quali campioni devono essere prelevati?	<ul style="list-style-type: none">• Siero della madre; ATTENZIONE: per escludere la PRRS nei suini, il siero deve essere prelevato dalla madre e da 5 altre scrofe dell'allevamento.• Parti della placenta• Tessuto fetale / liquido gastrico (caglio) / pelle (BVD)• <i>Tamponi vaginali da ruminanti</i> (solo se non è disponibile altro materiale abortivo per l'analisi della coxiellosi e delle clamidie).	
Quali epizoozie vengono analizzate?	Vedere la tabella sul retro di questo promemoria per lo spettro di epizoozie da analizzare in conformità con l'articolo 129 capoverso 3 OFE. Se necessario, lo spettro delle epizoozie da analizzare può essere esteso. Per ragioni di assunzione dei costi, è necessario discuterne in anticipo con il servizio veterinario cantonale competente.	
Punti da osservare per l'invio!	<ul style="list-style-type: none">• Imballaggio con contenitore primario e secondario a tenuta stagna e un imballaggio esterno (principio dei tre strati)• Etichettatura: «Sostanza biologica, categoria B» (etichetta a rombi UN3373)• Invio per posta A o corriere	
Dove vengono effettuate le analisi?	La diagnostica di laboratorio viene effettuata nei laboratori diagnostici riconosciuti per l'analisi delle epizoozie e nei laboratori degli istituti paraclinici delle facoltà Vetsuisse delle due università di Zurigo e Berna. Elenco dei laboratori riconosciuti	
Dati sulla domanda di analisi al laboratorio	Motivo dell'analisi:	sorveglianza ufficiale degli aborti
	IDAzienda	numero BDTA dell'azienda detentrica di animali in cui attualmente è tenuto l'animale abortito
	Identificazione dell'animale:	numero della marca auricolare BDTA della madre

Quale materiale deve essere prelevato?

	Agente patogeno / epizootia	Campione della madre	Campione della placenta e dei feti abortiti
	IBR/IPV BVD Brucellosi Coxiellosi	Siero	<ul style="list-style-type: none"> - Pelle (collo) (ca. 1.0 x 1.0 cm) oppure mezzo orecchio - Placenta - (Contenuto) dell'abomaso e organi fetali (polmone, fegato) - Tampone vaginale qualora placenta o feto non siano più disponibili

	Agente patogeno / epizootia	Campione della madre	Campione della placenta e dei feti abortiti
	Brucellosi Coxiellosi Aborto da clamidie	Siero	<ul style="list-style-type: none"> - Placenta - (Contenuto) dell'abomaso e organi fetali (polmone, fegato) - Tampone vaginale qualora placenta o feto non siano più disponibili

	Agente patogeno / epizootia	Campione della madre	Campione della placenta e dei feti abortiti
	Brucellosi PRRS Malattia di Aujeszky	Siero ATTENZIONE: per escludere la PRRS, il siero deve essere prelevato da un totale di 6 scrofe!	<ul style="list-style-type: none"> - Placenta e - organi fetali (polmone, fegato)