



Sesto Rapporto sull'alimentazione in Svizzera – errata corrige

Capitolo 2: pagina 83, figura 2.8. Contributo percentuale dei singoli gruppi di alimenti all'utilizzo di vitamina B12

L'utilizzo di vitamina B12 non è coperto per il 60 per cento da cereali, bensì da carne e prodotti a base di carne.

La barra nella figura dovrebbe essere rossa (carne, prodotti a base di carne) e non marrone (cereali).

Capitolo 3: pagina 152, tabella 3.5. Prevalenza dei fattori di rischio per le malattie cardiovascolari in base al sesso in due popolazioni di studio, 1993-2007.

La prevalenza per il trattamento dell'ipertensione nello studio CoLaus (47,1 % uomini, 53,8 % donne) non si riferisce a tutti gli uomini e le donne interrogati, bensì soltanto a coloro che hanno indicato di soffrire di ipertensione.

L'indicazione corretta è pertanto: tra gli interrogati, il 20,2 per cento degli uomini e il 16,6 per cento delle donne sono sottoposti a trattamenti contro l'ipertensione.

Capitolo 3: pagina 165, stima della prevalenza del diabete mellito nel 2030.

L'International Diabetes Federation (IDF) ha rivisto al ribasso le sue previsioni: la stima secondo cui in Svizzera nel 2030 la prevalenza di diabete mellito nei soggetti dai 20 ai 79 anni sarebbe stata nell'ordine del 10 per cento non è pertanto più corretta.

La dichiarazione corretta è: Si prevede che l'incidenza e la prevalenza del diabete mellito aumenteranno ulteriormente: si stima che nel 2030 la prevalenza del diabete mellito in Svizzera nei soggetti dai 20 ai 79 anni sarà nell'ordine dell'8,7 per cento (2011: 7,4 %) (194).