



Articolo nr. 4 della serie dell'USAV riguardanti i controlli sulla protezione degli animali nel pollame

Programma prioritario 2021- 2023: attenzione focalizzata sul trattamento degli animali malati o feriti

I volatili malati e/o devono essere trattati in base alle loro condizioni oppure uccisi in modo corretto. Si tratta di un principio ancorato alla legislazione sulla protezione degli animali. I detentori di animali sono responsabili di decidere sull'opportunità di una cura e di trattamenti; in caso contrario si impone la tempestiva uccisione degli animali malati o feriti. Nel quadro del programma prioritario si controlla il trattamento degli animali malati o feriti e si valutano le loro condizioni.

Questo articolo riguarda le seguenti categorie di animali: pollastrelle, galline ovaiole, animali della linea parentale, polli da ingrasso o tacchini. La persona incaricata dei controlli esamina se i criteri relativi al trattamento degli animali malati o feriti e alla loro uccisione sono soddisfatti. Ciò avviene ponendo delle domande al detentore degli animali, esaminando l'infrastruttura, gli strumenti utilizzati per l'uccisione e i documenti importanti nonché attraverso l'osservazione degli animali.

Gli animali malati e/o feriti vengono ricoverati, trattati e curati in modo adeguato

Reparto sanitario

Sempre più spesso vengono predisposti reparti per la prevenzione e la cura degli animali malati o feriti. L'allestimento di tali reparti sanitari è raccomandato ma non è obbligatorio, salvo nella tenuta dei tacchini. È importante che un reparto sanitario, quando viene predisposto, sia conforme ai requisiti posti dall'ordinanza sulla protezione degli animali. Ad esempio per le galline ovaiole devono essere disponibili un nido, della lettiera e dei posatoi.

Per i tacchini deve essere presente un settore sanitario oppure, se prima del controllo non ci sono ancora stati animali che necessitavano di particolari trattamenti, l'avicoltore deve mostrare come gli animali malati o feriti possono venire separati dall'effettivo.

Possibilità di occupazione

Nelle tenute di pollastrelle, galline ovaiole e animali della linea parentale possono apparire disturbi comportamentali come la pica delle piume e delle zampe. Per evitare questi problemi è necessario a, titolo preventivo, offrire sempre una possibilità di occupazione agli animali (ad esempio pietre da beccare, balle di paglia, reti riempite di fieno). Se il giorno del controllo vi sono animali che presentano ferite visibili, è importante poter mostrare le misure adottate per evitare un peggioramento della situazione. Tra queste misure possono rientrare delle possibilità aggiuntive di occupazione, una visita veterinaria come pure la cura degli animali feriti (tenuta in un reparto sanitario, trattamento delle ferite, eccetera). Gli animali con una prognosi sfavorevole devono essere uccisi (vedi sotto).

Zoppie

Nelle tenute di polli da ingrasso e di tacchini possono apparire casi di zoppia. Gli animali che presentano una zoppia manifesta o che non sono più in grado di muoversi devono essere curati oppure uccisi per porre fine alla loro sofferenza. Durante il controllo si conta il numero di animali che non si allontanano dal controllore mentre percorre la stalla in avanti e indietro (vedi tabella con le definizioni). Questo numero va poi messo in relazione con il numero totale di animali presenti nel pollaio:

$$\frac{\text{Numero di animali con evidente zoppia o incapacità a muoversi}}{\text{Numero di animali nel pollaio}} \times 100 \%$$

Per esempio: in un'azienda con 5000 polli il controllore, attraversando il pollaio nei due sensi, conta 2 polli con una evidente zoppia e un pollo che non si allontana nemmeno toccandolo leggermente con un piede. Il calcolo si presenta quindi nel modo seguente: $(2/5000) \times 100 \% = 0.04 \%$. Visto che il risultato non supera il valore di 0.1%, il criterio risulta soddisfatto. Se il giorno del controllo gli animali dovessero soffrire di una malattia che compromette la loro capacità di movimento, come ad esempio il rachitismo, occorre tenerne conto purché siano state adottate le misure del caso.

Definizioni

Zoppia evidente: L'animale si allontana dalla persona che cammina ma se siiede nuovamente dopo due o tre passi.

Incapacità a muoversi: L'animale non si muove quando ci si avvicina o dopo essere stato leggermente toccato.

Gli animali malati o feriti devono essere trattati tempestivamente o uccisi




Stordimento: Lo stordimento del pollame fino a 10 kg può essere eseguito con un colpo forte e mirato sulla testa. Il colpo deve essere inferto con un oggetto duro e smussato, adatto alla taglia dell'animale. I tacchini di oltre 10 kg di peso devono essere storditi con un apparecchio a proiettile captivo penetrante o non penetrante. Foto: Aviforum

Gli animali malati, feriti o indeboliti, per i quali cure e trattamenti non risultano opportuni perché causerebbero troppi dolori o per la scarsa probabilità di guarigione, devono essere immediatamente uccisi. Se un trattamento non entrasse in considerazione per motivi di ordine economico (ad esempio polli di ingrasso), gli animali malati, feriti o debilitati devono essere immediatamente soppressi.

L'uccisione va eseguita a regola d'arte. L'animale deve essere dapprima stordito (vedi immagini a sinistra) e in seguito ucciso mediante dislocazione cervicale (foto in basso). L'USAV ha pubblicato delle [informazioni tecniche](#) sull'uccisione corretta del pollame.

In sede di controllo il detentore degli animali dev'essere in grado di spiegare al controllore i metodi di uccisione utilizzati, mostrando le attrezzature destinate a tale scopo. Se in occasione del controllo ci fosse un animale malato, ferito o debilitato, si può procedere direttamente alla sua uccisione.



Uccisione: dopo lo stordimento, l'animale deve essere ucciso immediatamente. Il metodo di uccisione più utilizzato per il pollame è la dislocazione cervicale. L'uccisione può avvenire utilizzando un'apposita pinza adatta alla taglia dell'animale (foto a sinistra) oppure manualmente (foto a destra). Per gli animali di oltre 5 kg di peso la dislocazione cervicale non può venire eseguita manualmente. Foto: Aviforum

Quando il tasso di mortalità è elevato vengono prese delle misure

Il tasso di mortalità della partita di animali che si trovano in stalla il giorno del controllo viene calcolata come segue:

$$\frac{\text{Numero di animali morti dalla stabulazione}}{\text{Numero di animali stabulati}} \times 100$$

Misure devono essere adottate se il tasso di mortalità supera il 3% per i polli d'ingrasso e i tacchini rispettivamente l'1% ogni quattro settimane per le pollastrelle, le galline ovaiole negli animali della linea parentale. Se il giorno del controllo questo tasso viene superato, l'avicoltore deve dimostrare di aver adottato delle misure. Si possono citare a titolo di esempio una visita veterinaria oppure dei provvedimenti dettati dalla particolare situazione (come l'installazione di ventilatori se la mortalità è dovuta a stress termico). È importante che queste misure vengano documentate (ad esempio annotazioni nel registro con i dati sulla produzione, rapporto veterinario). L'attenzione va rivolta alle misure messe in atto piuttosto che al tasso di mortalità. Quindi perfino un tasso di mortalità superiore al valore di soglia non va considerato come una lacuna se le misure appropriate sono state messe in atto.

Per le prime quattro settimane di vita delle pollastrelle vale un'eccezione a questo criterio, considerato che durante questo periodo generalmente la mortalità è superiore all'1%. Ciò non comporta una lacuna se le condizioni di tenuta e le pratiche zootecniche sono ottimali.

Questo articolo è stato pubblicato nell'edizione di novembre 2020 della Schweizer Geflügelzeitung.

Il programma prioritario per il pollame si svolge nel periodo 2021-2023. Lo scopo consiste nell'assicurare la conformità della tenuta del pollame in merito ai punti seguenti: qualità dell'aria, densità di occupazione, qualità della lettiera e trattamento degli animali malati o feriti.

Per ulteriori informazioni e per le versioni in tedesco/francese: [Link](#)

Le Informazioni tecniche - Protezione degli animali N. 16.1 sull'uccisione corretta del pollame sono pubblicate sulla stessa pagina sotto il titolo «Informazioni tecniche sui polli».