



Informazioni

animali da compagnia

Giugno 2005

Raccomandazioni

Malattia di Newcastle (NCD) nel pollame: sintomi

Pensare subito alla malattia di Newcastle se dovessero apparire i seguenti sintomi:

I **primi sintomi** sono un rilevante calo della produzione d'uova, uova deformate, sottigliezza o mancanza dei gusci e diarrea di colore giallo-verdastro.

In caso di rapida diffusione nell'allevamento compaiono casi di morte improvvisa senza sintomi clinici visibili. Il tasso di mortalità degli animali infetti può raggiungere il 100%.

In caso di **decorso protratto della malattia** predominano i seguenti sintomi: febbre, estrema apatia, inappetenza, piumaggio arruffato, sintomi respiratori gravi (affanno con respirazione dal becco, tosse, starnuti), rigonfiamento dei palpebrali e cresta cianotica.

Dalla seconda settimana di malattia gli animali sopravvissuti, come conseguenza di un disturbo funzionale del cervello e dei nervi del midollo spinale, possono manifestare sintomi come paralisi flaccida delle zampe o delle ali e torsione del collo (torticollis).

Le caratteristiche anatomico-patologiche sono le seguenti: emorragie petecchiali allo stomaco ghiandolare ("boutons"), emorragie alle tonsille cecali e collasso dei follicoli ovarici.



Fonte: www.vet.uga.edu

Cresta cianotica di una gallina infetta (s.) e cresta di una gallina sana (d.)



Fonte: www.theranger.co.uk

Collo contorto (torticollis)



Uova deformate, gusci sottili, mancanza del guscio