



État: Mars 2016

Peste porcine classique (PPC) du porc domestique - symptômes

Vous devez absolument envisager la PPC lorsque vous constatez les symptômes suivants:

Forme aiguë:

Forte fièvre (jusqu'à 42°C, résistante au traitement) et cas (souvent nombreux) de mort soudaine. Inappétence, dépression, conjonctivite, diarrhée ou constipation. Hémorragies de forme ponctuelle ou plus étendue au niveau de la peau (pétéchies) ou cyanose de la peau (oreilles, groin, parties distales des extrémités, ventre, queue).

Mortalité élevée (jusqu'à 100%).

État pathologique: hémorragies de forme ponctuelle ou plus étendue au niveau de la peau, des reins, de l'épiglotte, du mésentère, des ganglions lymphatiques et de la vessie. Infarctus du bord de la rate, nécrose des amygdales et tuméfaction avec aspect marbré des ganglions lymphatiques.

Forme subaiguë à chronique:

L'évolution clinique de la maladie est caractérisée par des symptômes moins marqués et souvent non spécifiques qui peuvent être influencés par des infections bactériennes secondaires. On peut constater des phases fébriles récurrentes, des avortements, des petites portées, plus de perte chez les porcelets, plus de porcs rabougris, des troubles du système nerveux central (p. ex. paralysie des membres postérieurs, ataxie), des diarrhées, des lésions cutanées, une perte d'appétit, une mauvaise capacité d'engraissement, de la toux, etc.



photo: Prof. W. Zimmermann

Porc à l'engrais atteint de PPC aiguë
présentant des hémorragies cutanées
et une cyanose des oreilles



source: TiHo Hannover

Hémorragies ponctuelles sur l'épiglotte