



20 giugno 2011

Raccomandazioni sulle misure da prendere in caso di risultato positivo al virus Maedi Visna (MVV) nei caprini e sulle misure supplementari da prendere in caso di risultato positivo all'artrite encefalite virale caprina (CAE) negli effettivi misti di ovicaprini

Il programma nazionale è finalizzato alla lotta contro i SRLV dei genotipi B(CAEV). Tuttavia, anche altri fattori favoriscono o compromettono il successo della lotta a questi ceppi virali nelle popolazioni caprine, in particolare la presenza di caprini positivi al MVV o lo stretto contatto dei caprini con ovini positivi ai SRLV possono svolgere un ruolo fondamentale. Se i caprini positivi al MVV rimangono nell'effettivo, vi sarà un accumulo di questi animali nella popolazione caprina. I caprini positivi al MVV risulteranno nuovamente positivi al test ELISA nell'ambito delle analisi condotte a posteriori, implicando un'analisi di verifica. Lo stretto contatto tra caprini e ovini negli effettivi misti può comportare uno scambio di SRLV tra queste due specie animali.

Il presente documento formula, dunque, raccomandazioni in merito alle misure facoltative da prendere in caso di risultato positivo al MVV nei caprini e alle misure supplementari da prendere in caso di risultato positivo alla CAE negli effettivi misti di ovicaprini. Le misure facoltative che devono essere prese nel singolo caso devono essere decise, previa valutazione dello stato attuale dell'effettivo, dal detentore degli animali unitamente all'autorità cantonale. Le raccomandazioni sono le seguenti:

1. Raccomandazioni sulle misure da prendere in caso di risultato positivo al MVV nei caprini:
 - in caso di risultato positivo al MVV di uno o più caprini nell'effettivo, si raccomanda di eliminare i caprini positivi al MVV senza ulteriori conseguenze per l'effettivo a livello di polizia epizootica.
2. Raccomandazioni sulle misure supplementari da prendere in caso di risultato positivo alla CAE negli effettivi misti di ovicaprini:
 - per effettivi misti si intendono aziende con stabulazione mista di ovini e caprini; non rientrano in questa categoria le aziende che hanno esclusivamente pascoli ed estivazione comuni di ovini e caprini.
 - In caso di presenza di uno o più caprini positivi alla CAE in un effettivo misto, si raccomanda di sottoporre gli ovini ad analisi sierologiche a campione per accertare la presenza di SRLV. In base alla prevalenza della CAE dei caprini nell'effettivo, deve essere analizzato un determinato numero di ovini per accertare la presenza di SRLV secondo la seguente tabella.

Prevalenza CAE	Numero di ovini				
	< 10	10-19	20-49	50-99	> 100
< 10 %	9	9	18	33	50
10-19 %	9	9	15	18	20
20-50 %	4	5	10	10	10
> 50 %	4	5	6	6	6

- Se l'analisi a campione degli ovini comporta un risultato positivo ai SRLV dei genotipi B, al detentore di animali si raccomanda:
 - di concentrarsi o sulla detenzione di ovini o sulla detenzione di caprini o
 - di separare gli ovini e i caprini oppure
 - di far esaminare tutti gli ovini dell'effettivo riguardo ai SRLV e di abbattere di volta in volta gli ovini risultati positivi ai SRLV dei genotipi B.