



Domanda di analisi Peste suina africana nei cinghiali

Mittente:

Cognome, nome: _____

NPA: _____ Luogo: _____ Via: _____

N. tel.: _____

Attività: Guardiacaccia Cacciatore Veterinario ufficiale Altro: _____

Luogo di ritrovamento / abbattimento:

Coordinate geografiche: **X:** (ad es. 200000 oppure nuovo 1200000) _____

Y: (ad es. 600000 oppure nuovo 2600000) _____

NPA: _____ Luogo / Comune: _____

Descrizione del luogo di ritrovamento / abbattimento: _____

Data di ritrovamento / abbattimento: _____

Il luogo di ritrovamento si trova in un'area indenne da PSA

Il luogo di ritrovamento si trova in una zona epizootica definita (v. retro):

Zona di sequestro iniziale Zona di controllo Zona di osservazione

Zona di protezione suino domestico Zona di sorveglianza suino domestico Altro _____

Motivo della campionatura:

Ritrovamento animale morto Abbattimento per malattia Caccia / animale sano

Selvaggina morta per incidente Altro: _____ (Caccia regolare o decimazione della popolazione)

Campioni: tampone sangue tampone milza ID tampone

(tappo/provetta): _____

Prelievo dei campioni: Data: _____ Ora: _____

Informazioni sul cinghiale oggetto della campionatura:

Sesso: maschio femmina

Età: (v. sotto) piccolo (cinghialetto, fino a 6M, <20kg) subadulto / porcastrone (12-24M, 40-60kg)

giovane (cinghialetto rossastro, 6-12M, 20-40kg) adulto (>24M, >60kg)

Stato nutrizionale: buono / molto buono discreto scarso (magro)

Stato della carcassa: (v. sotto)

fresco decomposizione moderata decomposizione avanzata secco

Commenti:**Zone epizootiche**

Zona di sequestro iniziale, cinghiale:	dopo la scoperta dei primi casi, si delimita provvisoriamente una regione estesa che si ritiene, con ogni probabilità, non essere stata attraversata da cinghiali infetti.
Zona di controllo, cinghiale:	zona centrale + zona cuscinetto: regione che comprende tutti i casi positivi alla PSA e zone di attività dei branchi che possono essere entrati in contatto con la malattia.
Zona di osservazione, cinghiale:	regione che circonda la zona di controllo e che si suppone essere indenne dal virus.
Zone epizootiche, suino domestico:	se la PSA viene individuata nei suini domestici, l'area entro un raggio di 3 km diventa una zona di protezione e quella entro un raggio di 10 km una zona di sorveglianza.

Valutazione dello stato della carcassa

Fresco:	nessun odore di decomposizione, pelle intatta, carcassa non gonfia, arti rigidi.
Decomposizione moderata:	odore percettibile di decomposizione, non più rigidità degli arti (> 48 h), decolorazione della pelle (blu-verdastra), addome ipertrofico, cavità corporea eventualmente aperta; presenza di vermi.
Decomposizione avanzata:	odore di decomposizione da moderato a forte, liquefazione dei tessuti fino a marciume nero; perdita di carne muscolare; presenza di insetti.
Secco:	odore di decomposizione scarso o nullo, prevalentemente ossi sparsi, eventualmente ancora un po' di carne muscolare e resti di pelle secca.