



# Foglio illustrativo n. 2108 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

## Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Insetticida
Formulazione:	WP polvere bagnabile
Tenore di principi attivi:	25 % Metomil
Denominazione IUPAC:	S-methyl N-(methylcarbamoyloxy)thioacetimidate

## Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

## Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

## Prodotti commerciali

### Lannate 25 WP

Numero di omologazione federale: I-5315	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 14894	Titolare dell'autorizzazione estera: DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH, Germania

## Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
<b>Orticoltura</b>			
Cetrioli	Afidi , Larve defogliatrici	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 kg/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: Soltanto fino allo stadio 71 (BBCH).	1, 2, 3, 4, 5
Fagioli, Piselli	Afidi , Larve defogliatrici, Tripidi	Dosaggio: 1 kg/ha Termine d'attesa: 14 Giorni Applicazione: Soltanto fino allo stadio 40 (BBCH).	1, 2, 3, 4, 5
Melanzana, Peperone, Pomodori	Tripidi	Concentrazione: 0.1 % Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: Soltanto fino allo stadio 71 (BBCH).	1, 2, 3, 4, 5
Pieno campo: Angurie, Meloni	Afidi , Larve defogliatrici	Dosaggio: 1 kg/ha Termine d'attesa: 14 Giorni Applicazione: Soltanto fino allo stadio 71 (BBCH).	1, 2, 3, 4, 5
Serra: Bietola, Spinaci	Afidi , Larve defogliatrici, Tripidi	Dosaggio: 1 kg/ha Termine d'attesa: 14 Giorni	1, 2, 3, 4, 5

**Oneri generali / agronomici:**

- 2 SPe 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 3 Al massimo 2 trattamenti per coltura.
- 4 SPe 8 - Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi) o può essere utilizzato soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori.

**Oneri per la protezione dell'utilizzatore:**

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + una maschera di protezione per le vie respiratore (P2). Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 5 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.

**Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**

**Frafi PF**

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.