



# Foglio illustrativo n. 3726 / 2023

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

## Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi:	70 % Metiram
Denominazione IUPAC:	zinc ammoniate ethylenebis(dithiocarbamate) - poly(ethylenethiuram disulfide)

## Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

## Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

## Prodotti commerciali

### Polyram DF

Numero di omologazione federale: F-7271	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 8700107	Titolare dell'autorizzazione estera: BASF Italia SpA, Italia

### Polyram DF

Numero di omologazione federale: I-7270	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 7916	Titolare dell'autorizzazione estera: BASF Italia SpA, Italia

## Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
<b>Viticultura</b>			
Vite	Marciume nero, Peronospora della vite, Rossore parassitario	Concentrazione: 0.2 % Dosaggio: 3.2 kg/ha Termine d'attesa: 8 Settimane Applicazione: Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto.	1, 2, 3
Vite	Escoriosi della vite	Concentrazione: 0.2 % Dosaggio: 1.6 kg/ha Applicazione: BBCH 7-10 (Stadi C-D), Prima della fioritura.	1, 2, 4
<b>Campicoltura</b>			
Patate	Alternariosi delle solanacee, Peronospora della patata	Dosaggio: 3 kg/ha	2, 5, 6

**Oneri generali / agronomici:**

- 3 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4500 m<sup>2</sup>/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 4 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 07-10 (C-D), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 800 l/ha (base per il calcolo).
- 5 Trattamenti ad un intervallo di 7 - 10 giorni.
- 6 1° trattamento quando i cespugli nelle file si toccano.

**Oneri per la protezione dell'utilizzatore:**

- 1 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.
- 2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

**Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:****Frase PF**

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.