

Frumento, Segale autunnale	Ruggine bruna	Dosaggio: 0.5 - 1 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	1, 3, 4
Orzo	Macchie reticolate dell'orzo, Oidio dei cereali, Rincosporiosi, Ruggine bruna	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 31-51 (BBCH).	1, 3

Oneri generali / agronomici:

- 2 Al massimo 2 trattamenti per coltura.
- 3 Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- 4 Dose elevata soltanto per varietà fortemente sensibili.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.