



# Foglio illustrativo n. 6344 / 2020

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

## Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi:	50 % Ciprodinil
Denominazione IUPAC:	4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine

## Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

## Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

## Prodotti commerciali

### Chorus

Numero di omologazione federale: D-3817	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 4411-00	Titolare dell'autorizzazione estera: Spiess-Urania Chemicals GmbH, Germania

### Chorus 50 WG

Numero di omologazione federale: A-3116	Paese di provenienza: Austria
Numero di omologazione estero: 2615/0	Titolare dell'autorizzazione estera: Syngenta Agro GmbH, Austria

### Chorus

Numero di omologazione federale: F-3884	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 9500629	Titolare dell'autorizzazione estera: Syngenta Agro SAS, Francia

## Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
<b>Frutticoltura</b>			
Albicocco	Monilia dei rami e dei fiori	Concentrazione: 0.05 % Dosaggio: 0.8 kg/ha Applicazione: applicazione per via aerea, Stadi 60-69 (BBCH).	1, 2, 3
Albicocco, Pesco/pesco noce, Prugno/Susino	Monilia dei rami e dei fiori	Concentrazione: 0.05 % Dosaggio: 0.8 kg/ha Applicazione: Stadi 60-69 (BBCH).	2, 3, 4
Frutta a granelli	Marciume (Botrytis cinerea), Monilia dei rami e dei fiori, Ticchiolatura della frutta a granelli	Concentrazione: 0.05 % Dosaggio: 0.8 kg/ha Applicazione: Stadi 60-69 (BBCH).	2, 3, 4, 5, 6

**Oneri generali / agronomici:**

- 1 Al massimo 2 applicazioni per via aerea per anno.
- 3 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m<sup>3</sup>/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 4 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 5 Soltanto in combinazione con Malvin WG 0.1% (1.6 kg/ha), Delan WG 0.03% (480 g/ha) o Delan 500 SC 0.05% (0.8 l/ha).
- 6 Al massimo 3 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi.

**Oneri per la protezione dell'utilizzatore:**

- 2 Durante la preparazione della poltiglia è necessario indossare guanti di protezione. Durante l'applicazione è necessario indossare guanti di protezione, abiti di protezione e scarpe da lavoro.  
Dei sistemi di protezione durante l'applicazione (p.es. cabina di trattore chiusa) possono rimpiazzare l'abbigliamento di protezione se è assicurato che offrono una protezione comparabile o superiore.

**Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:****Frafi PF**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.