



Foglio illustrativo n. 6345 / 2020

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Stimolatore della difesa immunitaria naturale
Formulazione: WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi: 50 % Acibenzolar-S-metile
Denominazione IUPAC: 7-S-methyl-1,2,3-benzothiazodazolethioate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Bion 50 WG

Numero di omologazione federale: F-5963

Paese di provenienza: Francia

Numero di omologazione estero: 9600526

Titolare dell'autorizzazione estera: Syngenta France SAS, Francia

Bion 50 WG

Numero di omologazione federale: I-5964

Paese di provenienza: Italia

Numero di omologazione estero: 11062

Titolare dell'autorizzazione estera: Syngenta Crop Protection S.P.A., Italia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Frutticoltura			
Frutta a granelli	Efficacia parziale: Fuoco batterico	Dosaggio: 20 g/ha Applicazione: Prima della fioritura., Intervallo di 7 - 14 giorni tra le irrorazioni.	1, 2, 3, 4, 5
Frutta a granelli	Efficacia parziale: Fuoco batterico	Dosaggio: 40 g/ha Applicazione: Intervallo di 7 - 14 giorni tra le irrorazioni., Durante la fioritura.	1, 2, 3, 4, 6
Frutta a granelli	Efficacia parziale: Fuoco batterico	Dosaggio: 20 g/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Intervallo di 7 - 14 giorni tra le irrorazioni., Dopo la fioritura (BBCH 57-79).	1, 2, 3, 4, 7
Orticoltura			
Baby-Leaf (Chenopodiaceae)	Peronospora dello spinacio, Ticchiolatura dello spinacio	Concentrazione: 0.002 - 0.006 % Dosaggio: 20 - 60 g/ha Termine d'attesa: 1 Settimane	1, 8, 9

Insalate cappuccio	Peronospora della lattuga	Concentrazione: 0.006 % Dosaggio: 60 g/ha Termine d'attesa: 1 Settimane	1, 8, 9
Ravanello	Peronospora delle crucifere Efficacia parziale: Ruggine bianca	Dosaggio: 30 - 60 g/ha Termine d'attesa: 1 Settimane	1, 8, 10
Spinaci	Peronospora dello spinacio, Ticchiolatura dello spinacio	Concentrazione: 0.002 - 0.006 % Dosaggio: 20 - 60 g/ha Termine d'attesa: 1 Settimane	1, 8, 9
Campicoltura			
Frumento	Oidio dei cereali	Dosaggio: 60 g/ha Applicazione: Stadi 25-29 (BBCH).	8, 10, 11, 12

Oneri generali / agronomici:

- 2 Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 4 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 5 Al massimo 3 trattamenti per particella e per anno prima della fioritura.
- 6 Al massimo 2 trattamenti per particella e per anno durante la fioritura.
- 7 Al massimo 2 trattamenti per particella e per anno dopo la fioritura.
- 9 Al massimo 4 trattamenti per coltura.
- 10 Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- 11 Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
- 3 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una maschera di protezione per le vie respiratorie (P3) + occhiali di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 8 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una maschera di protezione per le vie respiratorie (P3) + occhiali di protezione.
- 12 Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frafi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.