



Foglio illustrativo n. 6351 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Fitoregolatore, Fungicida
Formulazione: EC concentrato emulsionato
Tenore di principi attivi: 6.7 % Metconazolo (60 g/l)
Denominazione IUPAC: (1RS,5RS,1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1ylmethyl)cyclopentanol

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Caramba SL

Numero di omologazione federale: D-4672 Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: PI 024487-00/023 Titolare dell'autorizzazione estera: Star Agro Analyse und Handels GmbH, Austria

Caramba

Numero di omologazione federale: D-4561 Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 4487-00 Titolare dell'autorizzazione estera: BASF AG, Germania

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Colza	Mal dello sclerozio	Dosaggio: 1.2 l/ha Applicazione: Stadi 61 - 65 (BBCH).	1, 2, 3, 4
Colza	Aumento della stabilità	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 13-27 o 30-39 (BBCH).	1, 3, 4
Colza	Marciume da phoma delle crocifere	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 20-27 o 30-31 (BBCH).	1, 3, 4
Frumento	Oidio dei cereali, Ruggine gialla	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 32-61 (BBCH).	3, 4, 5
Frumento	Septoriosi della spiga (S. nodorum)	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 51 - 61 (BBCH).	3, 4, 5
Frumento	Fusariosi della spiga	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 55 - 69 (BBCH).	3, 4, 5, 6

Frumento	Oidio dei cereali, Ruggine bruna, Ruggine gialla, Septoriosi della spiga (S. nodorum)	Dosaggio: 1.2 l/ha	3, 4, 5, 7
Frumento	Ruggine bruna	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	3, 4, 5
Girasole	Phoma del girasole	Dosaggio: 1.2 l/ha	3, 4, 8
Orzo	Macchie reticolate dell'orzo, Oidio dei cereali, Rincosporiosi	Dosaggio: 1.2 l/ha Applicazione: Stadi 31-51 (BBCH).	3, 4, 5, 7
Orzo	Macchie reticolate dell'orzo, Oidio dei cereali, Rincosporiosi	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 31-51 (BBCH).	3, 4, 5
Segale autunnale	Ruggine bruna	Dosaggio: 1.2 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	3, 4, 5, 7
Segale autunnale	Ruggine bruna	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	3, 4, 5
Triticale	Ruggine bruna, Ruggine gialla, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)	Dosaggio: 1.2 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 51 (BBCH).	3, 4, 5, 7

Oneri generali / agronomici:

- 1 Al massimo 1 trattamento per coltura e anno.
- 2 In combinazione con Derosal (0.4 kg/ha) in caso di forte infestazione.
- 3 SPe 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 5 Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
- 6 Dopo una semina senza lavorazione del suolo dopo frumento o mais.
- 7 In combinazione con Amistar (0.4 l/ha).
- 8 In combinazione con 0.4 kg/ha Carbendazim (60% WP) in caso di forte pressione della malattia.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 4 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera.
Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.
I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frazi PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.