



Foglio illustrativo n. 6477 / 2024

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Acaricida, Fungicida
Formulazione: SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi: 51.1 % Zolfo (700 g/l)
Denominazione IUPAC: sulfur

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Fragola	Oidio della fragola	Concentrazione: 0.2 - 0.4 % Dosaggio: 2 - 4 l/ha	1, 2, 3, 4, 5
Mora	Eriofidi gallicoli	Concentrazione: 1 % Dosaggio: 10 l/ha Applicazione: Dopo il germogliamento (lunghezza dei germogli: 10 -15 cm).	3, 4, 5, 6, 7
Mora	Eriofidi gallicoli	Concentrazione: 2 % Dosaggio: 20 l/ha Applicazione: Irrorazione al germogliamento.	3, 4, 5, 7
Uva spina	Oidio delle varietà di ribes	Concentrazione: 0.2 - 0.5 % Dosaggio: 2 - 5 l/ha	3, 4, 5, 8
Frutticoltura			
Frutta a granelli	Oidio della mela/pera Efficacia parziale: Ticchiolatura della frutta a granelli Effetti secondari: Eriofidi rugginosi	Concentrazione: 0.3 - 0.5 % Dosaggio: 4.8 - 8 l/ha Applicazione: Dall'inizio della fioritura, durante e dopo la fioritura.	3, 4, 5, 9, 10
Frutta a granelli	Oidio della mela/pera Efficacia parziale: Ticchiolatura della frutta a granelli Effetti secondari: Eriofidi rugginosi	Concentrazione: 0.75 % Dosaggio: 12 l/ha Applicazione: Al germogliamento.	3, 4, 5, 10
Frutta a granelli	Oidio della mela/pera Efficacia parziale: Ticchiolatura della frutta a granelli Effetti secondari: Eriofidi rugginosi	Concentrazione: 0.5 - 0.75 % Dosaggio: 8 - 12 l/ha Applicazione: Prima della fioritura.	3, 4, 5, 10

Frutta a nocciolo	Vaiolatura della frutta a nocciolo Effetti secondari: Eriofidi rugginosi	Concentrazione: 0.3 - 0.5 % Dosaggio: 4.8 - 8 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Dopo la fioritura.	3, 4, 5, 10, 11
Frutta a nocciolo	Vaiolatura della frutta a nocciolo Effetti secondari: Eriofidi rugginosi	Concentrazione: 0.75 % Dosaggio: 12 l/ha Applicazione: Prima della fioritura.	3, 4, 5, 10, 11
Pero / Nashi	Eriofidi gallicoli	Concentrazione: 2 % Dosaggio: 32 l/ha Applicazione: Dopo il raccolto.	3, 4, 5, 10
Pesco/pesco noce	Oidio della pesca, Ticchiolatura del pesco	Concentrazione: 0.3 - 0.5 % Dosaggio: 4.8 - 8 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Dopo la fioritura.	3, 4, 5, 10
Viticultura			
Vite	Acariosi della vite, Eriofide della vite	Concentrazione: 2 % Dosaggio: 16 l/ha Applicazione: Irrorazione al germogliamento.	3, 4, 5, 12
Vite	Oidio della vite	Concentrazione: 0.1 - 0.4 % Dosaggio: 1.6 - 6.4 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto.	3, 4, 5, 13, 14, 15
Orticoltura			
Cucurbitacee	Oidio delle Cucurbitacee	Concentrazione: 0.1 - 0.2 % Dosaggio: 1 - 2 l/ha Termine d'attesa: 3 Giorni	3, 4, 5
Erbette da cucina	Oidio (diverse specie) su erbe da cucina	Dosaggio: 2 l/ha Termine d'attesa: 14 Giorni	3, 4, 5, 16
Pomodori	Oidio delle solanacee	Concentrazione: 0.1 - 0.2 % Termine d'attesa: 3 Giorni	3, 4, 5
Coltivazione piante ornam.			
Pieno campo: Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Colture da fiore e piante verdi	Oidio (diverse specie) su piante ornamentali	Concentrazione: 0.2 %	3, 4, 5
Pieno campo: Lauro ceraso	Vaiolatura della frutta a nocciolo	Concentrazione: 0.2 %	3, 4, 5

Oneri generali / agronomici:

- 1 La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini". 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 2 Nessun trattamento tra la fioritura e fino alle fine del raccolto.
- 4 Il pacchetto vuoto deve essere due volte risciacquato con acqua, prima di poter essere smaltito.
- 5 Impiegare esclusivamente con un serbatoio per la poltiglia con miscelatore in funzione.
- 6 Secondo trattamento; nel caso di un forte attacco.
- 7 Per le more la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 8 La dose indicata si riferisce allo stadio "allegazione (50 - 90% delle infiorescenze hanno frutti visibili)", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 9 Trattamenti dopo la fioritura unicamente su varietà che tollerano lo zolfo.
- 10 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 11 Le albicocche sono sensibili allo zolfo, evitare trattamenti.
- 12 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 15-51 (F), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 800 l/ha (base per il calcolo).
- 13 Dose più elevata in caso di forte attacco.
- 14 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m²/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 15 Anche per applicazione per via aerea.
- 16 Al massimo 3 trattamenti per anno o coltura.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 3 Durante la preparazione e l'applicazione della poltiglia: indossare occhiali di protezione o una visiera.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

FraSI PF

Autorizzato per l'utilizzazione non professionale.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.