



Foglio illustrativo n. 7039 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Prodotto per la concia delle sementi, Fungicida
Formulazione:	ES emulsione per trattamento sementi o soluzione emulsionata per concia sementi
Tenore di principi attivi:	30.9 % Metalaxil-M (339.2 g/l)
Denominazione IUPAC:	methyl N-(methoxyacetyl)-N-2,6-xylyl-D-alaninate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Orticoltura			
Aglione, Cipolle, Scalogni	Pythium spp.	Dosaggio: 0.05 l/100 kg di sementi	1, 2, 3, 4
Baby-Leaf (Asteraceae)	Pythium spp.	Dosaggio: 0.2 l/100 kg di sementi Termine d'attesa: 4 Settimane	1, 2, 3, 4
Barbabietola, Bietola, Spinaci	Peronospora dello spinacio	Dosaggio: 0.2 l/100 kg di sementi	1, 2, 3, 4
Carote	Pythium spp.	Dosaggio: 0.1 l/100 kg di sementi	1, 2, 3, 4
Erbette da cucina	Peronospora (diverse specie) su erbe da cucina, Pythium spp.	Dosaggio: 0.2 l/100 kg di sementi Termine d'attesa: 7 Settimane	1, 2, 3, 4
Insalate (Asteraceae)	Pythium spp.	Dosaggio: 0.2 l/100 kg di sementi Termine d'attesa: 4 Settimane	1, 2, 3, 4
Melanzana	Peronospora della melanzana, Phytophthora spp., Pythium spp.	Dosaggio: 0.1 l/100 kg di sementi	1, 2, 3, 4
Meloni	Pythium spp.	Dosaggio: 0.1 l/100 kg di sementi	1, 2, 3, 4
Peperone	Peronospora del peperone, Phytophthora spp., Pythium spp.	Dosaggio: 0.1 l/100 kg di sementi	1, 2, 3, 4
Pomodori	Phytophthora spp., Pythium spp.	Dosaggio: 0.1 l/100 kg di sementi	1, 2, 3, 4
Ravanello	Peronospora delle crucifere	Dosaggio: 0.2 l/100 kg di sementi	1, 2, 3, 4
Specie di cavoli	Pythium spp.	Dosaggio: 0.2 l/100 kg di sementi	1, 2, 3, 4
Spinaci	Pythium spp.	Dosaggio: 0.05 l/100 kg di sementi	1, 3, 4
Valerianella	Peronospora della valerianella, Pythium spp.	Dosaggio: 0.2 l/100 kg di sementi Termine d'attesa: 4 Settimane	1, 2, 3, 4

Zucchine	Pythium spp.	Dosaggio: 0.1 - 0.1 l/100 kg di sementi	1, 2, 3, 4
Campicoltura			
Girasole	Peronospora del girasole	Dosaggio: 0.3 l/100 kg di sementi	1, 3, 4

Oneri generali / agronomici:

- 2 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
- 3 I sacchi contenenti sementi conciate devono essere designati con la seguente iscrizione sull'etichetta:
- Sementi conciate. Non ingerire! I residui non devono essere usati come foraggio o alimento, neanche se lavati.
- La denominazione commerciale , il(i) principio(i) attivo(i) e le frasi tipo per precauzioni da prendere del prodotto per la concia delle sementi.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Nel processo di concia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione.
- 4 Le etichette dei sacchi contenenti sementi conciate devono recare le seguenti indicazioni: "Nell'aprire i sacchi di sementi e nel caricare la seminatrice è necessario indossare guanti di protezione. Evitare la formazione e l'inalazione di polvere."

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.