



# Foglio illustrativo n. 7053 / 2023

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

## Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Erbicida  
Formulazione: EC concentrato emulsionato  
Tenore di principi attivi: 64 % Dimethenamid-P (720 g/l)  
Denominazione IUPAC: S-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-acetamide

## Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

## Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.  
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

## Prodotti commerciali

### spectrum

Numero di omologazione federale: D-7283      Paese di provenienza: Germania  
Numero di omologazione estero: 024803-00      Titolare dell'autorizzazione estera: BASF SE, Germania

### STAR Dimethenamid-P

Numero di omologazione federale: D-7176      Paese di provenienza: Germania  
Numero di omologazione estero: 024803-00/029      Titolare dell'autorizzazione estera: OGET Innovations GmbH, Austria

## Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
<b>Orticoltura</b>			
Fagioli con baccello	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.2 - 1.4 l/ha Applicazione: In pre-emergenza.	1
<b>Campicoltura</b>			
Barbabietole da foraggio e da zucchero	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.4 l/ha	1, 2
Fava	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.2 - 1.4 l/ha Applicazione: In pre-emergenza.	1
Girasole, Soia	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.2 - 1.4 l/ha Applicazione: In pre-emergenza.	1
Mais	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.2 - 1.4 l/ha Applicazione: Primavera; in pre-emergenza e in post-emergenza precoce fino allo stadio di 3 foglie (BBCH 00 - 13).	1

**Oneri generali / agronomici:**

- 2 Trattamnto frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato per anno e particella): Dallo stadio di cotiledone allo stadio 2 foglie: 0.2-0.3 l/ha; dallo stadio 4 foglie allo stadio 6 foglie: 0.5-0.9 l/ha.

**Oneri per la protezione dell'utilizzatore:**

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

**Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:****Frase PF**

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.