



Foglio illustrativo n. 7008 / 2023

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Insetticida (sostanza adescante per insetti, feromone)
Formulazione:	VP prodotto con principi attivi evaporabili
Tenore di principi attivi:	88.2 % Z8-12Ac [221 mg / dosatore]; 6.1 % E8-12Ac [15.3 mg/dosatore]; 1.7 % Z8-12OH ((Z)-8-dodecen-1-olo) [4.2 mg/dosatore]
Denominazione IUPAC:	(Z)-dodec-8-en-1-yl acetate; (E)-dodec-8-en-1-yl acetate; (Z)-dodec-8-en-1-ol

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Isomate Ofm Rosso Flex

Numero di omologazione federale: I-4843

Paese di provenienza: Italia

Numero di omologazione estero: 011549

Titolare dell'autorizzazione estera: CBC (Europe) Ltd, Italia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Frutticoltura			
Frutta a granelli, Pesco/pesco noce	Tortrice orientale del pesco	Dosaggio: 500 dosatore/ha Applicazione: In primavera.	1, 2, 3, 4, 5
Melo	Piccola tortrice dei frutti	Dosaggio: 500 dosatore/ha Applicazione: In primavera.	1, 2, 4, 5
Prugno/Susino	Tortrice delle susine	Dosaggio: 500 dosatore/ha Applicazione: In primavera.	1, 2, 3, 4, 5

Oneri generali / agronomici:

- 1 Uniformare il più possibile la modalità d'impianto e il popolamento.
- 2 La dimensione della piantagione non deve essere inferiore a 1 - 2 ha. La distanza tra le file non deve superare i 4.5 m.
- 4 Gli effettivi della popolazione di partenza devono essere possibilmente bassi (non oltre l'1 - 2% di attacchi nell'anno precedente).
- 5 È importante una buona isolamento (almeno 100 m da popolamenti non trattati).

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 3 Per manipolare e appendere i dosatori di feromoni indossare guanti di protezione.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.