



Foglio illustrativo n. 7515 / 2021

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi:	32.9 % Trifloxystrobin (375 g/l); 14 % Ciproconazolo (160 g/l)
Denominazione IUPAC:	(E,E)-methoxyimino-{2-[1-(3-trifluoromethyl-phenyl)-ethylideneaminooxymethyl]-phenyl}-acetic acid methyl ester; (2RS,3RS,2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Sphere 535 SC

Numero di omologazione federale: A-5588	Paese di provenienza: Austria
Numero di omologazione estero: 2978/3	Titolare dell'autorizzazione estera: Star Agro Analyse und Handels GmbH, Austria

Sphere

Numero di omologazione federale: D-6940	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 007974-00	Titolare dell'autorizzazione estera: Bayer CropScience AG, Germania

TRINAZOL

Numero di omologazione federale: D-7086	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: GP 007974-00/006	Titolare dell'autorizzazione estera: Agrimotion S. A., Polonia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Orticoltura			
Barbabietola	Cercosporiosi e ramulariosi	Dosaggio: 0.4 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2, 3, 4
Cicoria belga	Alternaria spp., Cercosporiosi e ramulariosi, Oidio delle Asteracee	Dosaggio: 0.4 l/ha	1, 2, 3, 5
Campicoltura			
Barbabietola da foraggio, Barbabietola da zucchero	Cercosporiosi e ramulariosi, Oidio delle barbabietole, Ruggine delle barbabietole	Dosaggio: 0.4 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	2, 6

Frumento	Ruggine gialla	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).	2, 7
Frumento	Bruciature fogliari (PLS)	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	2, 7, 8
Frumento	Septoriosi della spiga (S. nodorum)	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	2, 7
Frumento, Segale autunnale, Triticale	Ruggine bruna, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	2, 7
Frumento, Triticale	Oidio dei cereali	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).	2, 7
Girasole	Phoma del girasole, Phomopsis del girasole	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Stadio 51 (BBCH).	2, 7
Orzo	Macchie reticolate dell'orzo, Oidio dei cereali, Rincosporiosi, Ruggine nana dell'orzo	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Stadi 31-51 (BBCH).	2, 7
Segale autunnale, Triticale	Rincosporiosi	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	2, 7
Coltivazione piante ornam.			
Tappeti erbosi e terreni sportivi	Agente della macchia a forma di dollaro, Fusarium spp., Pythium spp., Rincosporiosi del tappeto erboso, Rizotomie delle graminacee, Ruggine delle graminacee	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Al più presto in maggio.	2, 4, 9

Oneri generali / agronomici:

- 1 Al massimo 3 trattamenti per coltura.
- 4 SPe 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 5 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
- 6 Al massimo 2 trattamenti per coltura.
- 7 Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- 8 In miscela estemporanea con Miros FL o Bravo 500 (1.0-1.5 l/ha).
- 9 Per proteggere gli organismi non bersaglio 3 trattamenti per particella e anno al massimo con un prodotto contenente Ciproconazolo.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 3 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frafi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.