



Foglio illustrativo n. 7529 / 2024

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Fungicida
Formulazione: SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi: 42 % Metrafenone (500 g/l)
Denominazione IUPAC: 3'-bromo-2,3,4,6'-tetramethoxy-2',6-dimethylbenzophenone

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Vivando

Numero di omologazione federale: F-6674
Numero di omologazione estero: 2060050
Paese di provenienza: Francia
Titolare dell'autorizzazione estera: BASF Agro SAS, Francia

Vivando

Numero di omologazione federale: I-6783
Numero di omologazione estero: 13698
Paese di provenienza: Italia
Titolare dell'autorizzazione estera: BASF Italia SpA, Italia

Vivando

Numero di omologazione federale: A-5366
Numero di omologazione estero: 3356-1
Paese di provenienza: Austria
Titolare dell'autorizzazione estera: STAR Agro Handels GmbH, Austria

Flexity

Numero di omologazione federale: I-5368
Numero di omologazione estero: 15346
Paese di provenienza: Italia
Titolare dell'autorizzazione estera: BASF Italia SpA, Italia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Viticultura			
Vite	Oidio della vite	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.16 - 0.32 l/ha Applicazione: Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto.	1, 2, 3

Orticoltura

Pieno campo: Cetrioli, Meloni, Oidio delle Cucurbitacee
Zucche (buccia non commestibile), Zucche con buccia commestibile

Dosaggio: 0.2 l/ha
Termine d'attesa: 3 Giorni
Applicazione: 1° trattamento in caso di rischio di infezione risp. su segnalazione del servizio d'allarme. , Stadi 11-89 (BBCH).
1, 4, 5

Oneri generali / agronomici:

- 2 Al massimo 3 trattamenti per anno.
- 3 Anche per applicazione per via aerea.
- 4 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
- 5 Al massimo 2 trattamenti a intervalli di 7 - 10 giorni.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

FraSI PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.