



Foglio illustrativo n. 7552 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Fungicida
Formulazione: WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi: 68 % Mancozeb ; 4.5 % Cimoxanil
Denominazione IUPAC: manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt; 1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Curzate M WG

Numero di omologazione federale: D-4595

Paese di provenienza: Germania

Numero di omologazione estero: 4573-00

Titolare dell'autorizzazione estera: DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH, Germania

Despina

Numero di omologazione federale: F-6011

Paese di provenienza: Francia

Numero di omologazione estero: 2140056

Titolare dell'autorizzazione estera: Phyteurop S.A., Francia

Curzate M WG

Numero di omologazione federale: B-4880

Paese di provenienza: Belgio

Numero di omologazione estero: 9520/B

Titolare dell'autorizzazione estera: Du Pont de Nemours (Belgium), Belgio

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Orticoltura			
Cipolle, Scalogni	Peronospora della cipolla	Dosaggio: 2.5 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: All'inizio dell'attacco.	1, 2
Insalate cappuccio	Peronospora della lattuga	Dosaggio: 1.6 kg/ha	2, 3, 4
Pomodori	Alternaria spp., Peronospora del pomodoro, Septoriosi del pomodoro/della melanzana	Concentrazione: 0.2 - 0.25 % Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: All'inizio dell'attacco.	4

Campicoltura

Patate

Alternariosi delle solanacee, Peronospora della patata

Dosaggio: 2.5 kg/ha
Termine d'attesa: 3 Settimane

4, 5, 6, 7

Oneri generali / agronomici:

- 2 In 200 - 400 l di acqua/ha.
- 3 Per l'allevamento di piante giovani e al più tardi entro 14 giorni dopo la piantagione nell'ubicazione definitiva
- 5 Al massimo 3 trattamenti per coltura.
- 6 Trattamenti ad un intervallo di 7 - 10 giorni.
- 7 Termine di attesa di 2 settimane per le patate primaticce.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 4 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

FraSI PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.