



Foglio illustrativo n. 7570 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	SL concentrato solubile in acqua
Tenore di principi attivi:	43.9 % Metalaxil-M (465 g/l)
Denominazione IUPAC:	methyl N-(methoxyacetyl)-N-2,6-xylyl-D-alaninate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Santhal

Numero di omologazione federale: F-6480	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 9800289	Titolare dell'autorizzazione estera: Syngenta Agro SAS, Francia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Orticoltura			
Carote	Pythium spp.	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Stadio 11-14 (BBCH), Applicazione per irrorazione.	1, 2
Cicoria belga	Phytophthora cryptogea	Dosaggio: 10 ml/hl Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Trattamento per immersione delle radici., ad inizio forzatura.	3, 4, 5
Cicoria belga	Phytophthora cryptogea	Dosaggio: 4 ml/t Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: ad inizio forzatura., Irrorazione delle radici.	3, 4, 6
Erbette da cucina	Peronospora (diverse specie) su erbe da cucina	Dosaggio: 0.2 - 0.22 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Applicazione per irrorazione.	7
Coltivazione piante ornam.			
Serra: Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Colture da fiore e piante verdi	Peronospora (diverse specie) su piante ornamentali, Phytophthora spp., Pythium spp.	Dosaggio: 5 l/ha Applicazione: Annaffiare.	8, 9, 10

Serra: Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Colture da fiore e piante verdi	Peronospora (diverse specie) su piante ornamentali, Phytophthora spp., Pythium spp.	Dosaggio: 25 ml/m ³ terriccio Applicazione: Trattamento del terriccio.	11
Serra: Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Colture da fiore e piante verdi	Peronospora (diverse specie) su piante ornamentali, Phytophthora spp., Pythium spp.	Concentrazione: 0.02 % Applicazione: Applicazione per irrorazione.	7, 12, 13

Oneri generali / agronomici:

- 1 Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- 3 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
- 4 Al massimo 1 trattamento.
- 8 Al massimo 2 trattamenti per coltura.
- 10 Primo trattamento subito dopo la piantagione, secondo trattamento dopo 3 settimane.
- 13 Al massimo 3 trattamenti per anno e particella.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 5 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera. Trattamento: Indossare guanti di protezione.
- 6 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione.
- 7 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera.
- 9 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera.
- 11 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera.
- 12 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frazi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.