



Foglio illustrativo n. 8026 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Fungicida
Formulazione: DC concentrato dispersibile
Tenore di principi attivi: 30 % zolfo calcico (380 g/l)
Denominazione IUPAC: calcium polysulfide

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Indicazioni autorizzate

| Campo d'applicazione | Agente patogeno/Efficacia | Applicazione nel rispetto di | (*) |
|----------------------|---------------------------------------|---|------------------|
| Frutticoltura | | | |
| Melo, Pero / Nashi | Ticchiolatura della frutta a granelli | Concentrazione: 1.2 % Dosaggio: 19.2 l/ha Termine d'attesa: 21 Giorni Applicazione: Dopo la fioritura. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Melo, Pero / Nashi | Ticchiolatura della frutta a granelli | Concentrazione: 1.6 % Dosaggio: 25.6 l/ha Termine d'attesa: 21 Giorni Applicazione: Prima della fioritura. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |

Oneri generali / agronomici:

- 1 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha.
- 3 Nessun trattamento, in presenza di persone non protette che potrebbero essere esposte alla deriva.
- 5 Pe 3: per la protezione di artropodi non target dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 6 SPe 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 2 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
- 4 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.