



# Foglio illustrativo n. 9021 / 2021

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

## Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Insetticida
Formulazione:	EC concentrato emulsionato
Tenore di principi attivi:	30.1 % Etofenprox (288 g/l)
Denominazione IUPAC:	2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

## Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

## Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

## Prodotti commerciali

### Etofenprox

Numero di omologazione federale: D-6169	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: GP 004634-00/015	Titolare dell'autorizzazione estera: Bernbeck LLP, Regno Unito

### Trebon 30 EC

Numero di omologazione federale: D-6918	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: GP 004634-00/014	Titolare dell'autorizzazione estera: OGET Innovations GmbH, Austria

## Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
<b>Orticoltura</b>			
Cavoli a testa	Altiche, Cavolaia, Nottue (defogliatrici), Tignola delle Crocifere	Dosaggio: 0.3 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: A partire dall'inizio dell'attacco.	1, 2, 3, 4
<b>Campicoltura</b>			
Colza	Punteruolo degli steli della colza	Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 6 Settimane Applicazione: Stadi 31-53 (BBCH).	1, 2, 4, 5
Colza	Altica della colza, Tentredine delle crocifere	Dosaggio: 0.2 l/ha Applicazione: In autunno.	1, 2, 4, 5
Colza	Cecidomia delle silique delle crocifere, Meligete della colza, Punteruolo delle silique delle crocifere	Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 6 Settimane Applicazione: Fino allo stadio fine sviluppo dei bottoni fiorali. (BBCH 59).	1, 2, 4, 5

**Oneri generali / agronomici:**

- 1 SPe 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 100 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 3 2 trattamenti per coltura ad un intervallo di almeno 2 settimane.
- 4 SPe 8: Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori.
- 5 Al massimo 1 trattamento per coltura e anno.

**Oneri per la protezione dell'utilizzatore:**

- 2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera.

**Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:****Frase PF**

- |       |   |
|-------|---|
|       | Tenere fuori dalla portata dei bambini.                       |
| SP 1  | Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. |
| SPe 8 | Pericoloso per le api   |