



Foglio illustrativo n. 9033 / 2021

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi:	50 % Triflurosulfuron-metile
Denominazione IUPAC:	Methyl 2-[4-dimethylamino-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]carbamoilsulfamoyl]-m-toluic acid

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Safari

Numero di omologazione federale: F-4141	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 9200073	Titolare dell'autorizzazione estera: Cheminova Agro France S.A.S,Francia

Debut

Numero di omologazione federale: A-4143	Paese di provenienza: Austria
Numero di omologazione estero: 2521-0	Titolare dell'autorizzazione estera: FMC Agro Austria GmbH,Austria

Safari

Numero di omologazione federale: I-4145	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 8886	Titolare dell'autorizzazione estera: Cheminova Agro Italia S.R.L.,Italia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Orticoltura			
Barbabietola	Dicotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 0.02 - 0.03 kg/ha Applicazione: In post-emergenza (BBCH 10-39).	1, 2, 3
Cicoria belga	Dicotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 0.02 - 0.03 kg/ha Applicazione: In post-emergenza (BBCH 10-39).	1, 3, 4

Campicoltura

Barbabietole da foraggio e da zucchero Dicotiledoni annuali (malerbe)

Dosaggio: 0.02 - 0.03 kg/ha 1, 2, 3
Applicazione: In post-emergenza (BBCH 10-39).

Oneri generali / agronomici:

- 1 SPe 3: per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 2 Al massimo 3 trattamenti per coltura ad un intervallo di 7-14 giorni.
- 4 Al massimo 2 trattamenti per coltura ad un intervallo di 7-14 giorni.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 3 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Fraasi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.