



# Foglio illustrativo n. 9036 / 2021

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

## Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Erbicida  
Formulazione: SG granulare solubile in acqua  
Tenore di principi attivi: 50 % Tribenuron-metile  
Denominazione IUPAC: methyl ester of 2-[4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl(methyl)carbamoylsulfamoyl]benzoic acid

## Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

## Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.  
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

## Prodotti commerciali

### Pointer SX

Numero di omologazione federale: D-6058  
Numero di omologazione estero: 005890-00

Paese di provenienza: Germania  
Titolare dell'autorizzazione estera: Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Germania

### Pointer SX

Numero di omologazione federale: A-5828  
Numero di omologazione estero: 2914-2

Paese di provenienza: Austria  
Titolare dell'autorizzazione estera: STAR Agro Handels GmbH, Austria

## Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
<b>Campicoltura</b>			
Cereali	Dicotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 60 g/ha Applicazione: In post-emergenza.	1, 2
Cereali	Dicotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 45 g/ha Applicazione: In post-emergenza.	2, 3
Girasole	Dicotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 60 g/ha Applicazione: In post-emergenza.	2, 4
Girasole	Dicotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 60 g/ha Applicazione: In post-emergenza.	2, 4, 5

## Oneri generali / agronomichi:

1 Trattamento in colture seminate in autunno.

- 3 Trattamento in colture seminate in primavera.
- 4 Trattamento solo su varietà di girasole resistenti al Tribenuron-metile.
- 5 Quale trattamento frazionato: 2 x 30g/ha ad un intervallo di 10 - 14 giorni.

**Oneri per la protezione dell'utilizzatore:**

- 2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione.

**Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**

**Frase PF**

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.