



Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

del 22 marzo 2023

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010¹ sui prodotti fitosanitari,
decide:

I prodotti fitosanitari

Gazelle SG (W 6581, 20 % Acetamiprid)

Barritus Rex (W 6581-2, 20 % Acetamiprid)

Oryx Pro (W 6581-3, 20 % Acetamiprid)

Pistol (W 6581-4, 20 % Acetamiprid)

sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2023 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti.

Applicazioni autorizzate:

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Frutticoltura			
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo	<i>Cimici pentatomidi</i>	Concentrazione: 0,02 % Dosaggio: 0,32 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: prefioritura o postfioritura (prima del BBCH 57 o a partire del BBCH 69)	1, 2, 3, 4
Orticoltura			
Serra: Melanzana, Peperone, Pomodori, Cetrioli	<i>Cimici pentatomidi</i>	Concentrazione: 0,05 % Termine d'attesa: 3 giorni	1, 5

¹ RS 916.161

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Coltivazione di bacche			
Fragola	<i>Cimici dei frutti</i>	Concentrazione: 0,025 % Dosaggio: 0,25 kg/ha Termine d'attesa: 14 giorni	6, 7, 8, 9, 10

Condizioni d'uso

- 1 I prodotti non sono stati testati contro le *Cimici pentatomidi* alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia.
- 2 Il dosaggio indicato si applica a un volume delle siepi di 10 000 m³/ha.
- 3 Al massimo 2 trattamenti per particella e anno.
- 4 SPe 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 5 Al massimo 2 trattamenti per coltura.
- 6 I prodotti non sono stati testati contro le *Cimici dei frutti* alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia.
- 7 Al massimo 1 trattamento per coltura e anno.
- 8 SPe 8: Pericoloso per le api – Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori.
- 9 La dose indicata si riferisce allo stadio «piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini», 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 10 Quantitativo di poltiglia: 400 – 1000 l/ha.

I prodotti fitosanitari

Audienc (W 6020, 480g/l Spinosad)

BIOHOP AudiENZ (W 6020-1, 480 g/l Spinosad)

Elvis (W 6020-2, 480 g/l Spinosad)

sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2023 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti.

Applicazioni autorizzate:

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Frutticoltura			
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo	<i>Cimici pentatomidi</i>	Concentrazione: 0,02 % Dosaggio: 0,32 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: prefioritura o postfioritura (prima del BBCH 57 o a partire dal BBCH 69)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Orticoltura			
Melanzana, Peperone, Pomodori, Cetrioli	<i>Cimici pentatomidi</i>	Concentrazione: 0,04 % Dosaggio: 0,4 l/ha Termine d'attesa: 3 giorni	1, 7, 8, 9, 10
Coltivazione di bacche			
Fragola	<i>Cimici dei frutti</i>	Concentrazione: 0,02 % Dosaggio: 0,2 l/ha Termine d'attesa: 3 giorni	6, 9, 11, 12, 13, 14, 15

Condizioni d'uso

- 1 I prodotti non sono stati testati contro le *Cimici pentatomidi* alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia.
- 2 Al massimo 2 trattamenti per particella e anno.
- 3 SPe 8 – Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba).
- 4 Il dosaggio indicato si applica a un volume delle siepi di 10 000 m³/ha.
- 5 SPe 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 6 Non utilizzare su frutti che a causa di lesioni secernono succo.
- 7 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 8 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.
- 9 SPe 8: Pericoloso per le api – Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori.
- 10 SPe 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 11 I prodotti non sono stati testati contro le *Cimici dei frutti* alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia.
- 12 Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno.
- 13 La dose indicata si riferisce allo stadio «piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini», 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 14 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione.
- 15 Fragole rimontanti: intervallo di 21 giorni tra i trattamenti.

I prodotti fitosanitari

Bandsen (W 7133, 24 g/l Spinosad)

Gesal Käfer- und Raupen-Stop (W 7133-1, 24 g/l Spinosad)

Perfetto (W 7133-2, 24 g/l Spinosad)

sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2023 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti.

Applicazioni autorizzate:

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Frutticoltura			
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo	<i>Cimici pentatomidi</i>	Concentrazione: 0,4 % Dosaggio: 6,4 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: prefioritura o postfioritura (prima del BBCH 57 o a partire dal BBCH 69)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Orticoltura			
Melanzana, Peperone, Pomodori, Cetrioli	<i>Cimici pentatomidi</i>	Concentrazione: 0,8 % Dosaggio: 8,0 l/ha Termine d'attesa: 3 giorni	1, 7, 8, 9, 10
Coltivazione di bacche			
Fragola	<i>Cimici dei frutti</i>	Concentrazione: 0,4 % Dosaggio: 4 l/ha Termine d'attesa: 3 giorni	6, 9, 11, 12, 13, 14, 15

Condizioni d'uso

- I prodotti non sono stati testati contro le *Cimici pentatomidi* alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia.
- Al massimo 2 trattamenti per particella e anno.
- SPe 8 – Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba).
- Il dosaggio indicato si applica a un volume delle siepi di 10 000 m³/ha.
- SPe 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- Non utilizzare su frutti che a causa di lesioni secernono succo.
- Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.
- SPe 8: Pericoloso per le api – Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori.

-
- 10 SPE 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampono non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
 - 11 I prodotti non sono stati testati contro le *Cimici dei frutti* alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia.
 - 12 Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno.
 - 13 La dose indicata si riferisce allo stadio «piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini», 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
 - 14 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione.
 - 15 Fragole rimontanti: intervallo di 21 giorni tra i trattamenti.
-

Il prodotto fitosanitario

Zorro (W 7153, 25 % Spinetoram)

è autorizzato temporaneamente fino al 31 ottobre 2023 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti.

Applicazioni autorizzate:

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Frutticoltura			
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo	<i>Cimici pentatomidi</i>	Concentrazione: 0,019 % Dosaggio: 0,3 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: dopo la fioritura (a partire dal BBCH 69)	1, 2, 3, 4, 5

Condizioni d'uso

- 1 Il prodotto non è stato testato contro *Halyomorpha halys* alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia.
 - 2 Il dosaggio indicato si applica a un volume delle siepi di 10 000 m³/ha.
 - 3 Al massimo 2 trattamenti per particella e anno.
 - 4 SPE 8: Pericoloso per le api – Non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata. Prima del trattamento eliminare colture intercalari o malerbe in fiore (sfalcio o pacciamatura).
 - 5 SPE 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampono non trattata di 100 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, si deve rispettare una zona tampono con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Le corsie devono essere ricoperte con una copertura vegetale compatta. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
 - 6 Intervallo di al meno 10 – 12 giorni tra i trattamenti.
-

Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.

29 marzo 2023

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Il direttore, Hans Wyss

² RS 172.021