



## **Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari**

del 7 marzo 2024

---

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,  
visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010<sup>1</sup> sui prodotti fitosanitari,  
decide:*

### I prodotti fitosanitari

Biorga Contra Schwefel (W-18-4, 80 % zolfo)

Capito Bio-Schwefel (W-18-2, 80 % zolfo)

Celos (W-6873, 80 % zolfo)

Elosal Supra (W-986, 80 % zolfo)

Elosal Supra (W-7258, 80 % zolfo)

Kumulus WG (W-4458, 80 % zolfo),

Microthiol Spécial Disperss (W-7170, 80 % zolfo)

Microthiol Spécial Disperss (W-7258-1, 80 % zolfo)

Mycosan-S (W-4495-1, 80 % zolfo)

Mycosan-S (W-7227-1, 80 % zolfo)

Netzschwefel Stulln (W-7227, 80 % zolfo)

Sanoplant Schwefel (W-18-3, 80 % zolfo)

Schwefel 80 WG (W-4495, 80 % zolfo)

Solfovit WG (W-4458-1, 80 % zolfo)

Sufralo (W-18-1, 80 % zolfo)

THIOVIT (W-7367, 80 % zolfo)

Thiovit Jet (W-18, 80 % zolfo)

sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti:

<sup>1</sup> RS 916.161

**Applicazioni autorizzate:**

Ambito di applicazione	Effetto	Modalità di applicazione	Condizioni
<b>Frutticoltura</b>			
Nocciolo	<i>Eriofide del nocciolo</i> ( <i>Phytoptus avellanae</i> )	Concentrazione: 0.45 % Dose: 7.2 kg/ha Applicazione: Da marzo	1, 2, 3, 4, 5

**Condizioni d'uso**

- 1 Al massimo 2 trattamenti per anno e particella
- 2 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10 000 m<sup>3</sup>/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 3 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione.
- 4 SPe 3: per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli articoli 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 5 SPe 8: Pericoloso per le api – Non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata. Prima del trattamento eliminare colture intercalari o malerbe in fiore (sfalcio o pacciamatura).

**Nota**

I prodotti non sono stati testati per le applicazioni indicate alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantire che non ci siano effetti di fitotossicità sulla coltura.

**I prodotti fitosanitari**

Actiol (W-5162-1, 52.4 %, 723 g/l zolfo)

BIOHOP HelioSOUFRE (W-5323-1, 51.1 %, 700 g/l zolfo)

Heliosoufre S (W-5323, 51.1 %, 700 g/l zolfo)

Soufre FL (W-5162, 52.4 %, 723 g/l zolfo)

Thiovit Liquid (W-5323-2, 51.1 %, 700 g/l zolfo)

sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti:

**Applicazioni autorizzate:**

Ambito di applicazione	Effetto	Modalità di applicazione	Condizioni
<b>Frutticoltura</b>			
Nocciolo	<i>Eriofide del nocciolo frutta a nocciolo (Phytoptus avellanae)</i>	Concentrazione: 0.45 % Dose: 7.2 l/ha Applicazione: Da marzo	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

**Condizioni d'uso**

- 1 Al massimo 2 trattamenti per anno e particella.
- 2 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10 000 m<sup>3</sup> ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 3 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera.
- 4 Durante l'applicazione della poltiglia: indossare occhiali di protezione o una visiera.
- 5 Impiegare esclusivamente con un serbatoio per la poltiglia con miscelatore in funzione.
- 6 SPe 3: per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli articoli 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 7 SPe 8: Pericoloso per le api – Non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata. Prima del trattamento eliminare colture intercalari o malerbe in fiore (sfalcio o pacciamatura).

**Nota**

I prodotti non sono stati testati per le applicazioni indicate alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantire che non ci siano effetti di fitotossicità sulla coltura.

**Revoca dell'effetto sospensivo**

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>2</sup> sulla procedura amministrativa.

*Rimedi giuridici*

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.

7 marzo 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare  
e di veterinaria:

Il direttore, Hans Wyss

