Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

del 22 maggio 2025

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010[1] sui prodotti fitosanitari,
decide:

I prodotti fitosanitari

Gazelle SG (W 6581, 20 % Acetamiprid)

Barritus Rex (W 6581-2, 20 % Acetamiprid)

Oryx Pro (W 6581-3, 20 % Acetamiprid)

Pistol (W 6581-4, 20 % Acetamiprid)

Gepard (W 6581-5, 20 % Acetamiprid)

sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2025 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti:

Applicazioni autorizzate:

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Coltivazione di bacche			
Mora, lampone	*Popillia japonica*	Dosaggio: 250 g/ha Termine d'attesa: 24 giorni	1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16
Fragola, cinorrodi, mirtillo, moro nero	*Popillia japonica*	Dosaggio: 250 g/ha Termine d'attesa: 1 giorno	1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16
Sambuco nero	*Popillia japonica*	Dosaggio: 250 g/ha Termine d'attesa: 28 giorni	1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16
Minikiwi	*Popillia japonica*	Dosaggio: 250 g/ha Termine d'attesa: 42 giorni	1, 3, 7, 11, 12, 13, 15, 16
Uva spina, josta	*Popillia japonica*	Dosaggio: 250 g/ha Termine d'attesa: 21 giorni	1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16

1 RS **916.161**

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Piante ornamentali			
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), colture da fiore e piante verdi	*Popillia japonica*	Concentrazione: 0,025 % Dosaggio: 250 g/ha	1, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16
Campicoltura			
Mais	*Popillia japonica*	Dosaggio: 300 g/ha Stadi 51-75 (BBCH) Termine d'attesa: 14 giorni	1, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 16
Viticoltura			
Vite	*Popillia japonica*	Concentrazione: 0,02 % Dosaggio: 320 g/ha Termine d'attesa: 42 giorni Dallo stadio 20 (BBCH)	1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16

Condizioni d'uso

1 Trattamento soltanto su indicazione dei servizi fitosanitari cantonali.
2 Al massimo 2 trattamenti per particella e anno.
3 SPe 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del servizio di omologazione.
4 SPe 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del servizio di omologazione.
5 Al massimo 2 trattamenti per coltura.
6 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
7 Al massimo 1 trattamento per particella e anno.
8 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4500 m^3/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle istruzioni del Servizio di omologazione.
9 Non trattare su uva da tavola.
10 SPe 8: pericoloso per le api – non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata. Prima del trattamento eliminare colture intercalari o malerbe in fiore (sfalcio o pacciamatura).
11 Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: indossare indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
12 Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
13 In caso di utilizzo in aree verdi di terze persone, come giardini, i proprietari e i residenti nella zona di trattamento devono essere informati del tempo d'attesa per l'accesso. Devono essere informati che non si può entrare nell'area trattata il giorno del trattamento e che le colture provenienti dall'area trattata possono essere consumate solo dopo il termine d'attesa specifico per la coltura.

14 Nel caso di aree verdi pubbliche utilizzate da terze persone è necessario informare che il giorno del trattamento non è consentito accedere all'area trattata (inclusi i parchi giochi, parchi e impianti sportivi).
15 Al momento di ordinare l'intervento, l'autorità cantonale competente può delegare l'adempimento degli obblighi di informazione di cui ai numeri 13 e 14.
16 Negli spazi verdi utilizzati da terze persone, come giardini o spazi verdi pubblici (inclusi i parchi giochi, parchi e impianti sportivi), gli utilizzatori professionali devono garantire:
   a. di ridurre al minimo la deriva:
      i. utilizzando apparecchiature adatte (irroratori manuali o a spalla), che producono goccioline di diametro superiore a 100 µm, e
      ii. applicando il prodotto per quanto possibile in assenza di vento;
   b. che durante l'applicazione nessun terzo o animale domestico si trovi nella zona da trattare;
   c. che le finestre e le porte dei locali situati all'interno o in prossimità della zona da trattare restino chiuse fino al termine del trattamento.

Nota

I prodotti non sono stati testati per le applicazioni indicate alle condizioni pratiche svizzere, non è pertanto possibile garantirne l'efficacia e l'assenza di fitotossicità.

I prodotti fitosanitari

Nemagreen (W-5810)

Nematop (W-5950)

Galanem (W 6336)

Meginem Pro (W 6336-1)

Meganem (W 6336-2)

Bio Garden Älchen gegen Dickmaulrüssler-Larven (W 6336-3)

Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Dickmaulrüsslerlarven (W 6336-4)

Dickmaulrüssler-Nematoden (W 6336-5)

BIOHOP NemaGAL (W 6336-6)

Biorga Contra Nematoden gegen Dickmaulrüssler (W 6336-7)

Larvanem (W-7032)

sono autorizzati temporaneamente fino al 30 novembre 2025 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti:

Applicazioni autorizzate:

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Frutticoltura			
In generale	*Popillia japonica*	Dosaggio: 1 milione di nematodi/m^2	1, 2, 3
Coltivazione di bacche			
In generale	*Popillia japonica*	Dosaggio: 1 milione di nematodi/m^2	1, 2, 3
Coltivazione piante ornam.			
In generale	*Popillia japonica*	Dosaggio: 1 milione di nematodi/m^2	1, 2, 3
Campicoltura			
In generale	*Popillia japonica*	Dosaggio: 1 milione di nematodi/m^2	1, 2, 3
Orticoltura			
In generale	*Popillia japonica*	Dosaggio: 1 milione di nematodi/m^2	1, 2, 3
Viticoltura			
In generale	*Popillia japonica*	Dosaggio: 1 milione di nematodi/m^2	1, 2, 3
Superfici per la promozione della biodiversità (SPB) OPD			
In generale	*Popillia japonica*	Dosaggio: 1 milione di nematodi/m^2	1, 2, 3
Selvicoltura			
In generale	*Popillia japonica*	Dosaggio: 1 milione di nématodi/m^2	1, 2, 3, 4
Superfici non coltive			
In generale	*Popillia japonica*	Dosaggio: 1 milione di nematodi/m^2	1, 2, 3, 4

Condizioni d'uso

1 L'efficacia di questo prodotto dipende fortemente dalle condizioni di applicazione (ad es. temperatura, umidità, coltura, substrato ecc).
2 Si raccomanda vivamente di sorvegliare accuratamente l'infestazione prima e dopo i lanci. Anche l'effettivo degli ausiliari dovrebbe essere controllato regolarmente. Prima dei lanci, è vietato utilizzare qualsiasi prodotto nocivo per gli ausiliari durante un periodo determinato.
3 Trattamento soltanto su indicazione dei servizi fitosanitari cantonali.
4 Applicazione in conformità ai divieti e alle restrizioni applicabili ai sensi dell'allegato 2.5 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS *814.81*).

Nota

I prodotti non sono stati testati per le applicazioni indicate alle condizioni pratiche svizzere, non è pertanto possibile garantirne l'efficacia e l'assenza di fitotossicità.

Il prodotto fitosanitario

DCT Delta 4 160D (4 g/kg di deltametrina), rete impregnata di insetticida con durata d'azione prolungata, è autorizzato temporaneamente fino al 31 ottobre 2025 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti:

Applicazione autorizzata:

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Tutte le colture	*Popillia japonica*	1.5 rete/ha Reti di 4 m^2	1, 2, 3, 4

Condizioni d'uso

1 Trattamento soltanto su indicazione dei servizi fitosanitari cantonali.
2 SPe 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali.
3 SPe 8: pericoloso per le api – non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata. Prima del trattamento eliminare colture intercalari o malerbe in fiore direttamente sotto le reti (sfalcio o pacciamatura).
4 Durante l'applicazione: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.

Nota

Il prodotto non è stato testato per l'applicazione indicata alle condizioni pratiche svizzere, non è pertanto possibile garantirne l'efficacia e l'assenza di fitotossicità.

Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968[2] sulla procedura amministrativa.

2 RS **172.021**

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; deve essere inoltrato in duplice copia e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

22 maggio 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Il direttore, Hans Wyss