

Campicoltura – Risultati del riesame mirato di prodotti fitosanitari autorizzati 2014

Data: 01.12.2014

Nella tabella seguente sono elencate tutte le nuove prescrizioni di applicazione per prodotti fitosanitari (PF) autorizzati nella coltura, emerse dal programma di riesame mirato 2014. Non sono presenti prodotti d'importazione parallela*, prodotti con permesso di vendita* e PF omologati esclusivamente per uso non professionale (hobbistica). Se in un settore esaminato non vengono inserite nuove prescrizioni di applicazione, sono valide quelle già esistenti. Le autorizzazioni modificate con le prescrizioni di applicazione complete in genere vengono pubblicate insieme a fine anno (al più tardi a gennaio dell'anno successivo), dopo la stagione di massima applicazione dei PF, nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online (www.blw.admin.ch) ➔ Temi ➔ Protezione dei vegetali ➔ Prodotti fitosanitari ➔ Elenco dei prodotti fitosanitari).

In caso di revoca di un'indicazione, il PF interessato può essere venduto secondo le disposizioni di omologazione vigenti nell'indicazione stessa per 12 mesi dalla data di modifica dell'autorizzazione (con la menzione di tale indicazione) e applicato, conseguentemente, per un ulteriore anno.

Per informazioni o domande contattare il Settore Protezione sostenibile dei vegetali dell'UFAG.

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
	Settori esaminati	
Principio attivo: FENPROPIMORF (Categoria di prodotto: fungicida)	Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: novembre 2014	
	Data della modifica dell'autorizzazione: 04.09.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Opus Top</i> (W-5382, W-5369, W-5377)	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione e applicazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi
	Acque sotterranee	Carote - Max. 2 trattamenti per coltura e anno
	Organismi acquatici	SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento
	Altri organismi non bersaglio**	
<i>Fortress Top</i> (W-6068)	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione e applicazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi
	Acque sotterranee	
	Organismi acquatici	SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento
	Altri organismi non bersaglio**	
<i>Capalo</i> (W-6730, W-6731)	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione e applicazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi (nella preparazione di Capalo W-6730 più occhiali)
	Acque sotterranee	
	Organismi acquatici	SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento
	Altri organismi non bersaglio**	

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
	Settori esaminati	
Principio attivo: TEBUCONAZOLO (Categoria di prodotto: fungicida)		
Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2014		Data della modifica dell'autorizzazione: 16.09.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Fezan (W-6589)</i> <i>Horizont 250 EW (W-5468)</i>	Consumatori	
	Utilizzatori e lavoratori	Tutte le indicazioni - Preparazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi, occhiali/visiera; applicazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi
	Organismi acquatici	Colza con 1,5 l/ha, lino - SPe 3: zona tampone non trattata di 6 m contro il rischio di deriva
	Altri organismi non bersaglio**	
<i>Pronto Plus (W-5935)</i>	Consumatori	
	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi, occhiali/visiera
	Organismi acquatici	
	Altri organismi non bersaglio**	
<i>Tebucur 250 (W-6438)</i> <i>Tebusha 25% EW (W-6810)</i>	Consumatori	
	Utilizzatori e lavoratori	Tutte le indicazioni - Preparazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi, occhiali/visiera; applicazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi
	Organismi acquatici	Colza - SPe 3: zona tampone non trattata di 6 m contro il rischio di deriva
	Altri organismi non bersaglio**	
Principio attivo: FENPROPIDIN (Categoria di prodotto: fungicida)		
Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2014		Data della modifica dell'autorizzazione: 16.09.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Gladio (W-6557)</i>	Consumatori	
	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi, occhiali/visiera; applicazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi
	Organismi acquatici	SPe 3: zona tampone non trattata di 50 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento
	Altri organismi non bersaglio**	
<i>Astor (W-5005)</i>	Consumatori	
	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione della poltiglia: guanti, occhiali/visiera; applicazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi
	Organismi acquatici	SPe 3: zona tampone non trattata di 50 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento
	Altri organismi non bersaglio**	
<i>Orius Top (W-6762, W-6759)</i>	Consumatori	
	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi, occhiali/visiera
	Organismi acquatici	SPe 3: zona tampone non trattata di 50 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento
	Altri organismi non bersaglio**	

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
	Settori esaminati	
Principio attivo: PROTIOCONAZOLO (Categoria di prodotto: fungicida)		
Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2014		Data della modifica dell'autorizzazione: 16.09.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Input</i> (W-6392)	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi, occhiali/visiera; applicazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi
	Organismi acquatici	
	Altri organismi non bersaglio**	
<i>Prosaro</i> (W-6370) <i>Fandango</i> (W-6508)	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi
	Organismi acquatici	
	Altri organismi non bersaglio**	
<i>Aviator Xpro</i> (W-6761)	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione della poltiglia: occhiali/visiera
	Organismi acquatici	
	Altri organismi non bersaglio**	
<i>Tilmor</i> (W-6834) <i>Proline</i> (W-6339)	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi, occhiali/visiera
	Organismi acquatici	
	Altri organismi non bersaglio**	
<i>Scenic</i> (W-6428)	Utilizzatori e lavoratori	Concia: guanti, indumenti protettivi Apertura dei sacchi di sementi e caricamento della seminatrice: guanti; evitare la formazione e l'inalazione di polvere.
	Organismi acquatici	
	Altri organismi non bersaglio**	Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici le sementi conciate devono essere interamente incorporate al terreno; assicurarsi che le sementi conciate siano completamente incorporate all'estremità dei solchi. Per proteggere uccelli e mammiferi selvatici, recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente.
Principio attivo: FLUAZINAM (Categoria di prodotto: fungicida)		
Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: gennaio 2015		Data della modifica dell'autorizzazione: 28.10.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Mapro</i> (W-6782) <i>Ohayo</i> (W-6913) <i>Signal</i> (W-6747) <i>Winby</i> (W-6967) <i>Frownicide</i> (W-6968)	Consumatori	Patate - Termine di attesa 2 settimane; patate novelle - Termine di attesa 1 settimana
	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi, occhiali/visiera; applicazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi
	Organismi acquatici	SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento
	Altri organismi non bersaglio**	
	In generale	Riduzione del dosaggio a 0,4 l/ha

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione				
	Settori esaminati				
<i>Ibiza SC (W-6601)</i>	Consumatori				
	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione e applicazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi			
	Organismi acquatici	SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento			
	Altri organismi non bersaglio**				
	In generale	Riduzione del dosaggio a 0,4 l/ha			
<i>Epoque (W-5487)</i>	Consumatori	Termine di attesa 2 settimane			
	Utilizzatori e lavoratori				
	Organismi acquatici	SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento			
	Altri organismi non bersaglio**				
Principio attivo: DIMETACLOR (Categoria di prodotto: erbicida) <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;"> Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: ottobre 2014 </td> <td style="width: 33%; border: none;"> Data della modifica dell'autorizzazione: 28.04.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione) </td> <td style="width: 33%; border: none;"></td> </tr> </table>			Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: ottobre 2014	Data della modifica dell'autorizzazione: 28.04.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: ottobre 2014	Data della modifica dell'autorizzazione: 28.04.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)				
<i>Brasan Trio (W-6023)</i>	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione della poltiglia: guanti			
	Acque sotterranee	SPe 1: non più di 0,75 kg di principio attivo/ha sulla stessa particella nell'arco di 3 anni SPe 2: divieto di applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2			
	Organismi acquatici	SPe 3: zona tampone non trattata di 6 m contro il rischio di deriva			
	Altri organismi non bersaglio**				
	In generale	Max. 1 trattamento per coltura Non incorporare il prodotto nel terreno 3-4 l/ha: dose d'applicazione più bassa per i suoli leggeri e medi; dose più elevata per i suoli pesanti			
Principio attivo: NAPROPAMID (Categoria di prodotto: erbicida) <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;"> Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: ottobre 2014 </td> <td style="width: 33%; border: none;"> Data della modifica dell'autorizzazione: 29.04.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione) </td> <td style="width: 33%; border: none;"></td> </tr> </table>			Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: ottobre 2014	Data della modifica dell'autorizzazione: 29.04.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: ottobre 2014	Data della modifica dell'autorizzazione: 29.04.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)				
<i>Nikkel (W-4786)</i> <i>Napronol (W-4552)</i> <i>Devrinol FL (W-2892)</i>	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione della poltiglia: guanti, occhiali/visiera			
	Acque sotterranee				
	Organismi acquatici				
	Altri organismi non bersaglio**	Tabacco – Riduzione del dosaggio a max. 2 l/ha			
<i>Devrinol Plus (W-2808)</i>	Utilizzatori e lavoratori				
	Acque sotterranee				
	Organismi acquatici				
	Altri organismi non bersaglio**	Tabacco – Riduzione del dosaggio a max. 2,5 l/ha			

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
	Settori esaminati	
<i>Devrinol Top</i> (W-5916)	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione della poltiglia: guanti, occhiali/visiera
	Acque sotterranee	
	Organismi acquatici	
	Altri organismi non bersaglio**	Tabacco – Riduzione del dosaggio a max. 2,5 l/ha
Principio attivo: ACLONIFEN (Categoria di prodotto: erbicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2014
		Data della modifica dell'autorizzazione: 08.10.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Bandur</i> (W-6149, W-4387)	Consumatori	
	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione della poltiglia: guanti; applicazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi
	Organismi acquatici	A partire da 2,5 l/ha – SPe 3: zona tampone non trattata di 50 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento Meno di 2,5 l/ha – SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento
	Altri organismi non bersaglio**	Riduzione del dosaggio a max. 4 l/ha
<i>Carioca</i> (W-6580)	Consumatori	
	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione della poltiglia: guanti; applicazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi
	Organismi acquatici	SPe 3: zona tampone non trattata di 50 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento
	Altri organismi non bersaglio**	
Principio attivo: PIRIMICARB (Categoria di prodotto: insetticida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: gennaio 2015
		Data della modifica dell'autorizzazione: 28.10.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Pirimicarb</i> (W-4541, W-4821) <i>Pirimicarb 50 WG</i> (W-4367, W-4665, W-5171, W-5339) <i>Pirimor</i> (W-1899, W-5105)	Consumatori	Favette, piselli proteici, cereali, colza - Max. 1 trattamento con un prodotto contenente Pirimicarb Girasoli (solo W-4665), barbabietole da zucchero – Max. 2 trattamenti con un prodotto contenente Pirimicarb Patate per la produzione di tuberi-seme – Max. 3 trattamenti con un prodotto contenente Pirimicarb
	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione della poltiglia: guanti, occhiali/visiera
	Acque sotterranee	
	Organismi acquatici	Piselli proteici, barbabietole da zucchero – Zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento Tabacco - Zona tampone non trattata di 6 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento
	Api	
	Altri organismi non bersaglio**	Tabacco (solo W-4655) - Max. 2 trattamenti

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: METOMIL (Categoria di prodotto: insetticida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: gennaio 2015	
		Data della modifica dell'autorizzazione: 07.11.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Lannate 25 WP (W-1752)</i> <i>Methomyl 25 WP (W-2993)</i> <i>Methomyl LG (W-4413)</i>	Utilizzatori e lavoratori		
	Organismi acquatici		
	Api		
	Altri organismi non bersaglio**	Revoca dell'applicazione sul luppolo	
Principio attivo: BIFENTRIN (Categoria di prodotto: insetticida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: ottobre 2014	
		Data della modifica dell'autorizzazione: 13.03.2014 decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Talstar SC (W-6043)</i>	Api	Tutte le indicazioni: SPe 8 – Pericoloso per le api: divieto di entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe); può essere applicato solo in serre chiuse, a condizione che non vi siano impollinatori; divieto di applicazione in caso di piante in fiore sulle particelle limitrofe	
	Organismi acquatici	Piselli proteici – SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva Colza, cereali, barbabietole, patate – SPe 3: zona tampone non trattata di 50 m contro il rischio di deriva	
	In generale	Piselli proteici, colza - Max. 1 trattamento per coltura Cereali, barbabietole, patate - Max. 2 trattamenti per coltura	
Principio attivo: DELTAMETRINA (Categoria di prodotto: insetticida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: gennaio 2015	
		Data della modifica dell'autorizzazione: 06.11.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Decis (W-2372)</i> <i>Decis Protech (W-6381)</i> <i>Deltamethrin (W-6319)</i> <i>Deltaphar (W-6799)</i>	Organismi acquatici	Dosaggio a partire da 7,5 g di principio attivo/ha – SPe 3: zona tampone non trattata di 100 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento Dosaggio fino a 7,5 g di principio attivo/ha – SPe 3: zona tampone non trattata di 50 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento	
	Api	Tutte le indicazioni: SPe 8 – Pericoloso per le api: può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture limitrofe, siepi) unicamente in assenza di volo delle api (di sera) o può essere applicato solo in serre chiuse, a condizione che non vi siano impollinatori	
	In generale	Revoca dell'applicazione contro i meligeti della colza Max. 1 trattamento (escl. luppolo: max. 3) Dorifora della patata - SPa 1: per evitare l'insorgere di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti piretroidi per più di 1 volta per coltura	
<i>Decis Granulat (W-4040)</i>	Organismi acquatici	Zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento	

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
	Settori esaminati	
Principio attivo: ALFA-CIPERMETRINA (Categoria di prodotto: insetticida)		
Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: gennaio 2015		Data della modifica dell'autorizzazione: 06.11.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Alpha-Cypermethrin (W-6320)</i> <i>Fastac Perlen (W-5702)</i>	Consumatori	Max. 1 trattamento con un prodotto contenente alfa-Cipermetrina
	Organismi acquatici	Revoca dell'applicazione contro l'afide del luppolo sul luppolo SPE 3: zona tampone non trattata di 100 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento
	Api	Tutte le indicazioni: SPE 8 – Pericoloso per le api: può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture limitrofe, siepi) unicamente in assenza di volo delle api (di sera) o può essere applicato solo in serre chiuse, a condizione che non vi siano impollinatori
	In generale	Revoca dell'applicazione contro i meligeti della colza Dorifora della patata - SPA 1: per evitare l'insorgere di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti piretroidi per più di 1 volta per coltura
Principio attivo: ZETA-CIPERMETRINA (Categoria di prodotto: insetticida)		
Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: gennaio 2015		Data della modifica dell'autorizzazione: 06.11.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Fury 10 EW (W-5953)</i>	Consumatori	Max. 1 trattamento con un prodotto contenente zeta-Cipermetrina
	Utilizzatori e lavoratori	
	Acque sotterranee	
	Organismi acquatici	Revoca dell'applicazione contro l'afide del luppolo sul luppolo SPE 3: zona tampone non trattata di 100 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento
	Api	Tutte le indicazioni: SPE 8 – Pericoloso per le api: può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture limitrofe, siepi) unicamente in assenza di volo delle api (di sera) o può essere applicato solo in serre chiuse, a condizione che non vi siano impollinatori
	Altri organismi non bersaglio**	SPE 3: per la protezione di artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi (in virtù degli art. 18a e 18b LPN). Tale distanza può essere ridotta adottando misure di riduzione della deriva riportate nelle istruzioni dell'UFAG.
	In generale	Revoca dell'applicazione contro i meligeti della colza Dorifora della patata - SPA 1: per evitare l'insorgere di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti piretroidi per più di 1 volta per coltura

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: CIPERMETRINA (Categoria di prodotto: insetticida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: gennaio 2015	
		Data della modifica dell'autorizzazione: 06.11.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Cypermethrin (W-4343), W-4774, W-5587, Cypermethrin S (W-4976) Cypermethrin (W-4491) Cythrin Max (W-6715)</i>	Consumatori	Max. 1 trattamento con un prodotto contenente Cipermetrina	
	Organismi acquatici	Revoca dell'applicazione contro l'afide del luppolo sul luppolo Riduzione del dosaggio a max. 25 g di principio attivo/ha SPe 3: zona tampone non trattata di 100 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento	
	Api	Tutte le indicazioni: SPe 8 – Pericoloso per le api: può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture limitrofe, siepi) unicamente in assenza di volo delle api (di sera) o può essere applicato solo in serre chiuse, a condizione che non vi siano impollinatori	
	In generale	Revoca dell'applicazione contro i meligeti della colza Dorifora della patata - SPa 1: per evitare l'insorgere di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti piretroidi per più di 1 volta per coltura	
Principio attivo: LAMBDA-CIALOTRINA (Categoria di prodotto: insetticida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2014	
		Data della modifica dell'autorizzazione: 09.10.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Karate (W-2920) Karate WG (W-6591) Karate with Zeon Technology (W-6098) Ravane 50 (W-6382) Kaiso EG (W-6953)</i>	Api	Tutte le indicazioni (eccetto patate per la produzione di tuberi-seme) - SPe 8 – Pericoloso per le api: può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture limitrofe, siepi) unicamente in assenza di volo delle api (di sera) o può essere applicato solo in serre chiuse, a condizione che non vi siano impollinatori	
	In generale	Max. 1 trattamento (escl. luppolo e patate per la produzione di tuberi-seme) Revoca dell'applicazione contro i meligeti della colza Dorifora della patata - SPa 1: per evitare l'insorgere di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti piretroidi per più di 1 volta per coltura	
Principio attivo: ACETAMIPRID (Categoria di prodotto: insetticida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: gennaio 2015	
		Data della modifica dell'autorizzazione: 07.11.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Gazelle SG (W-6581)</i>	Organismi acquatici	Applicazione sul tabacco contro la mosca bianca con 0,5 kg/ha Zona tampone non trattata di 6 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento	

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: IMIDACLOPRID (Categoria di prodotto: insetticida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: gennaio 2015	Data della modifica dell'autorizzazione: 07.11.2014 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Bazooka</i> (W-6725)	Utilizzatori e lavoratori		
<i>Confidor OD</i> (W-6468)	Organismi acquatici	Luppolo – Zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento Tabacco - Zona tampone non trattata di 100 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento	
	Api		
	Altri organismi non bersaglio**		
<i>Confidor WG 70</i> (W-5514)	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione e applicazione della soluzione da soffiare: guanti	
<i>Kohinor 70 WG</i> (W-6780, W-6778)	Organismi acquatici	Zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento	
	Api		
<i>Warrant 700 WG</i> (W-6818)	Altri organismi non bersaglio**		
<i>Imidachem</i> (W-6812, W-6951)	Utilizzatori e lavoratori	Preparazione della poltiglia/soluzione da soffiare: occhiali/visiera	
	Organismi acquatici	Luppolo – Zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento Tabacco - Zona tampone non trattata di 100 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento	
	Api		
	Altri organismi non bersaglio**		
	In generale		
<i>Gaucho</i> (W-5110)	Utilizzatori e lavoratori	Concia delle sementi: guanti, indumenti protettivi; preparazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi, maschera di protezione per le vie respiratorie (FFP2) Le etichette dei sacchi contenenti sementi conciate devono recare la seguente indicazione «Usare guanti protettivi nell'aprire i sacchi di sementi e nel caricare la seminatrice. Evitare la formazione e l'inalazione di polvere»	
	Organismi acquatici		
	Api		
	Altri organismi non bersaglio**		
	In generale	Le etichette dei sacchi contenenti sementi conciate devono recare le seguenti indicazioni: – sementi conciate. Non ingerire! I residui non devono essere usati come foraggio o alimento, neanche se lavati - la denominazione commerciale, il(i) principio(i) attivo(i) e le frasi tipo per precauzioni da prendere del prodotto per la concia delle sementi - per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici il prodotto deve essere interamente incorporato nel suolo; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato all'estremità dei solchi - per proteggere uccelli e mammiferi selvatici, recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente	

- * I prodotti d'importazione parallela sono PF esteri che corrispondono a un prodotto di riferimento autorizzato in Svizzera e sono omologati in virtù degli articoli 36 segg. OPF. I prodotti con permesso di vendita (in virtù dell'art. 43 OPF) sono identici a un altro prodotto di riferimento già autorizzato, ma il loro nome commerciale può essere lo stesso o diverso. I numeri di autorizzazione si differenziano solo per una cifra aggiunta sul permesso di vendita (p.es. W-1234 contro W-1234-1).
- ** Altri organismi generalmente ritenuti non bersaglio comprendono mammiferi, uccelli, artropodi non bersaglio (NTA, non target arthropods), piante non bersaglio (NTP, non target plants) e organismi presenti nel suolo (vermi, collemboli, microrganismi).