



Packungsbeilage Nr. 8361 / 2023

für Pflanzenschutzmittel gemäss Artikel 36 der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln

(Pflanzenschutzmittelverordnung, SR 916.161).

Produkteigenschaften

Sachbezeichnung:	Stimulator der natürlichen Abwehrkräfte
Formulierung:	SL Wasserlösliches Konzentrat
Wirkstoffgehalt:	1.02 % COS-OGA (12.5 g/l)
IUPAC-Name:	Lineares Copolymer aus alpha-1,4-D- Galactopyranosyluronsäuren und methylveresterten Galactopyranosyluronsäuren (9 bis 20 Einheiten) mit dem linearen Copolymer beta-1,4-verknüpfte 2-Amino-2-deoxy-D-glucopyranose und 2-Acetamid-2-deoxy-D-glucopyranose ...

Lagerung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist.

Entsorgung

Gebinde:	Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr.
Mittelreste:	Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Handelsprodukte

FytoSave

Eidg. Zulassungsnummer: D-7167	Herkunftsland: Deutschland
Ausländische Zulassungsnummer: 00A259-00	Ausl. Bewilligungsinhaber: FytoFend S.A.,Belgien

Bewilligte Indikationen

Anwendungsgebiet	Schaderreger/Wirkung	Anwendung unter Einhaltung von	(*)
Beerenbau			
Gewächshaus: Erdbeere	Teilwirkung: Echter Mehltau der Erdbeere	Konzentration: 0.2 % Aufwandmenge: 2 l/ha	1, 2
Weinbau			
Reben	Teilwirkung: Echter Mehltau der Rebe, Falscher Mehltau der Rebe	Konzentration: 0.125 % Aufwandmenge: 2 l/ha Anwendung: Vor- und Nachblütebehandlungen bis spätestens Mitte August.	2, 3, 4
Gemüsebau			
Gewächshaus: Aubergine, Paprika, Tomaten	Echter Mehltau der Solanaceae	Konzentration: 0.4 %	2
Gewächshaus: Kürbisgewächse (Cucurbitaceae)	Echter Mehltau der Kürbisgewächse	Konzentration: 0.4 %	2

Allgemeine / Agronomische Auflagen:

- 1 Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf Stadium "Vollblüte bis Beginn Rotfärbung der Früchte", 4 Pflanzen pro m² sowie eine Referenzbrühmenge von 1000 l/ha. Die Aufwandmenge ist gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle an das Stadium der zu behandelnden Kultur anzupassen.
- 2 Das Produkt vor dem Gebrauch gut schütteln. Im Spritztank bei laufendem Rührwerk anwenden. Bei Spritzgeräten ohne Rührwerk Brühe regelmässig schütteln/rühren.
- 3 Auch für die Luftapplikation.
- 4 Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf Stadium BBCH 71-81 (J-M, Nachblüte) und eine Referenzbrühmenge von 1600 l/ha (Berechnungsgrundlage) oder auf ein Laubwandvolumen von 4500 m³ pro ha. Die Aufwandmenge ist gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle an das Laubwandvolumen anzupassen.

Auf der Packung aufzudruckende Gefahrenkennzeichnungen:**PSM-Sätze**

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.