



Packungsbeilage Nr. 6945 / 2020

für Pflanzenschutzmittel gemäss Artikel 36 der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
(Pflanzenschutzmittelverordnung, SR 916.161).

Produkteigenschaften

Sachbezeichnung:	Insektizid
Formulierung:	SC Suspensionskonzentrat
Wirkstoffgehalt:	40.4 % Thiacloprid (480 g/l)
IUPAC-Name:	N-{3-[(6chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide

Lagerung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist.

Entsorgung

Gebinde:	Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr.
Mittelreste:	Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Handelsprodukte

Calypso

Eidg. Zulassungsnummer: F-5402	Herkunftsland: Frankreich
Ausländische Zulassungsnummer: 2060133	Ausl. Bewilligungsinhaber: Bayer CropScience S.A., Frankreich

Tiaprid

Eidg. Zulassungsnummer: D-4602	Herkunftsland: Deutschland
Ausländische Zulassungsnummer: PI 024714-00/028	Ausl. Bewilligungsinhaber: Menora GmbH, Österreich

Thiacloprid 480

Eidg. Zulassungsnummer: D-6311	Herkunftsland: Deutschland
Ausländische Zulassungsnummer: GP 024714-00/049	Ausl. Bewilligungsinhaber: Bernbeck LLP, Vereinigtes Königreich

Calypso 480SC

Eidg. Zulassungsnummer: D-5224	Herkunftsland: Deutschland
Ausländische Zulassungsnummer: PI 004714-00/039	Ausl. Bewilligungsinhaber: Star Agro Analyse und Handels GmbH, Österreich

Bewilligte Indikationen

Anwendungsgebiet	Schaderreger/Wirkung	Anwendung unter Einhaltung von	(*)
Beerenbau			
Brombeere	Kirschessigfliege	Konzentration: 0.02 % Aufwandmenge: 0.2 l/ha Wartefrist: 3 Tage Anwendung: Stadium 85-89 (BBCH).	1, 2, 3, 4

Brombeere	Blattläuse (Röhrenläuse), Erdbeer- oder Himbeerblütenstecher	Konzentration: 0.02 % Aufwandmenge: 0.2 l/ha Wartefrist: 3 Woche(n)	1, 2, 3, 4, 5
Erdbeere	Blattläuse (Röhrenläuse), Erdbeer- oder Himbeerblütenstecher	Konzentration: 0.02 % Aufwandmenge: 0.2 l/ha Wartefrist: 3 Woche(n)	2, 3, 5, 6, 7
Heidelbeere	Blattläuse (Röhrenläuse), Napfschildläuse	Konzentration: 0.02 % Aufwandmenge: 0.2 l/ha Wartefrist: 3 Woche(n)	1, 2, 3, 8, 9
Himbeere	Kirschessigfliege	Konzentration: 0.02 % Aufwandmenge: 0.2 l/ha Wartefrist: 3 Tage Anwendung: Stadium 85-89 (BBCH).	1, 2, 3, 10
Himbeere	Blattläuse (Röhrenläuse), Erdbeer- oder Himbeerblütenstecher, Himbeerkäfer	Konzentration: 0.02 % Aufwandmenge: 0.2 l/ha Wartefrist: 3 Woche(n)	1, 2, 3, 5, 10
Mini-Kiwi	Blattläuse (Röhrenläuse), Napfschildläuse	Konzentration: 0.02 % Wartefrist: 3 Woche(n)	1, 2, 3, 8
Ribes Arten	Blattläuse (Röhrenläuse), Napfschildläuse	Konzentration: 0.02 % Aufwandmenge: 0.2 l/ha Wartefrist: 3 Woche(n)	1, 2, 3, 8, 9
Schwarze Apfelbeere	Blattläuse (Röhrenläuse), Napfschildläuse	Konzentration: 0.02 % Wartefrist: 3 Woche(n)	1, 2, 3, 8
Schwarzer Holunder	Blattläuse (Röhrenläuse)	Konzentration: 0.02 % Wartefrist: 3 Woche(n)	1, 2, 3, 8
Obstbau			
Apfel	Apfelwickler Nebenwirkung: Kleiner Fruchtwickler	Konzentration: 0.025 % Aufwandmenge: 0.4 l/ha Wartefrist: 3 Woche(n) Anwendung: Im Sommer.	2, 11, 12, 13
Apfel	Apfelblütenstecher	Konzentration: 0.02 % Aufwandmenge: 0.32 l/ha Anwendung: Knospenaufbruch (BBCH 52-53).	2, 11, 12, 13
Apfel, Birne / Nashi, Zwetschge / Pflaume	Sägewespen	Konzentration: 0.02 % Aufwandmenge: 0.32 l/ha Anwendung: Beim Abblühen (BBCH 69-71).	2, 11, 12, 13
Aprikose	Pflaumenblattsauger	Konzentration: 0.02 % Aufwandmenge: 0.32 l/ha Anwendung: Stadium 03-59 (BBCH).	2, 11, 12, 13, 14
Birne / Nashi	Blattwespen	Konzentration: 0.02 % Aufwandmenge: 0.32 l/ha Wartefrist: 3 Woche(n)	2, 8, 11, 12, 13
Birne / Nashi, Quitte	Apfelwickler	Konzentration: 0.025 % Aufwandmenge: 0.4 l/ha Wartefrist: 3 Woche(n) Anwendung: Im Sommer.	2, 11, 12, 13
Esskastanie	Früher Esskastanienwickler, Kastanienbohrer, Kastanienwickler	Konzentration: 0.025 % Aufwandmenge: 0.4 l/ha Wartefrist: 3 Woche(n)	2, 8, 11, 12, 13
Haselnuss	Blattläuse (Röhrenläuse), Haselnussbohrer	Konzentration: 0.025 % Aufwandmenge: 0.4 l/ha Wartefrist: 3 Woche(n)	2, 8, 11, 12, 13
Kernobst	Miniermotten	Konzentration: 0.02 % Aufwandmenge: 0.32 l/ha Wartefrist: 3 Woche(n)	2, 8, 11, 12, 13
Kernobst, Steinobst	Blattläuse (Röhrenläuse) Nebenwirkung: Frostspanner	Konzentration: 0.02 % Aufwandmenge: 0.32 l/ha Wartefrist: 3 Woche(n)	2, 11, 12, 13, 15
Kirsche	Kirschenfliege	Konzentration: 0.02 % Aufwandmenge: 0.32 l/ha Wartefrist: 2 Woche(n)	2, 11, 12, 13, 16
Kirsche	Kirschkernstecher	Konzentration: 0.02 % Aufwandmenge: 0.32 l/ha Anwendung: Nach der Blüte (BBCH 69-72).	2, 11, 12, 13
Walnuss	Apfelwickler, Walnussfruchtfliege	Konzentration: 0.025 % Aufwandmenge: 0.4 l/ha Wartefrist: 3 Woche(n)	2, 8, 11, 12, 13
Zwetschge / Pflaume	Pflaumenwickler	Konzentration: 0.025 % Aufwandmenge: 0.4 l/ha Wartefrist: 3 Woche(n)	2, 11, 12, 13
Feldbau			
Kartoffeln	Kartoffelkäfer	Aufwandmenge: 0.1 l/ha Wartefrist: 3 Woche(n) Anwendung: Intervall: 2 Wochen.	3, 7, 17, 18

Raps	Kohlschotenrüssler, Rapsglanzkäfer	Aufwandmenge: 0.2 l/ha Anwendung: Bis Ende Entwicklung der Blütenknospen (BBCH 59).	2, 3, 7
Zierpflanzen			
Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst), Blumenkulturen und Grünpflanzen	Blattläuse (Röhrenläuse), Gemeine Kommaschildlaus, Napfschildläuse, Wollläuse (Schmierläuse)	Konzentration: 0.02 %	2, 12, 13, 19
Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst), Blumenkulturen und Grünpflanzen, Rosen	Weisse Fliegen (Mottenschildläuse)	Konzentration: 0.03 %	2, 12, 13, 19
Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst), Blumenkulturen und Grünpflanzen, Rosen	Dickmaulrüssler	Aufwandmenge: 6 ml/100 l Substrat Anwendung: Drenchapplikation.	12, 19, 20, 21
Rosen	Blattläuse (Röhrenläuse), Gemeine Kommaschildlaus, Napfschildläuse	Konzentration: 0.02 %	2, 12, 13, 19

Allgemeine / Agronomische Auflagen:

- 1 SPE 3: Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 20 m zu Oberflächengewässern einhalten. Zum Schutz vor den Folgen einer Abschwemmung eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene Pufferzone von mindestens 6 m einhalten. Reduktion der Distanz aufgrund von Drift und Ausnahmen gemäss den Weisungen des BLW.
- 2 Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus der selben Wirkstoffgruppe.
- 4 Für Brombeeren bezieht sich die angegebene Aufwandmenge auf Stadium "Erste Blüten bis etwa 50% der Blüten offen" sowie eine Referenzbrühmenge von 1000 l/ha. Die Aufwandmenge ist gemäss den Weisungen des BLW an das Stadium der zu behandelnden Kultur anzupassen.
- 5 Anwendung kurz vor der Blüte, bei langandauerndem Flug des Blütenstechers Anwendung wiederholen.
- 6 Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf Stadium "Vollblüte bis Beginn Rotfärbung der Früchte", 4 Pflanzen pro m² sowie eine Referenzbrühmenge von 1000 l/ha. Die Aufwandmenge ist gemäss den Weisungen des BLW an das Stadium der zu behandelnden Kultur anzupassen.
- 7 SPE 3: Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift und einer allfälligen Abschwemmung ist eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene unbehandelte Pufferzone von 6 m zu Oberflächengewässern einzuhalten.
- 8 Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).
- 9 Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf Stadium "50 - 90% der Blütenstände mit sichtbaren Früchten" sowie eine Referenzbrühmenge von 1000 l/ha. Die Aufwandmenge ist gemäss den Weisungen des BLW an das Stadium der zu behandelnden Kultur anzupassen.
- 10 Für Sommerhimbeeren bezieht sich die angegebene Aufwandmenge auf Stadium "Erste Blüten bis etwa 50% der Blüten offen" sowie eine Referenzbrühmenge von 1000 l/ha.
Für Herbsthimbeeren bezieht sich die Aufwandmenge auf eine Heckenhöhe von 150 - 170 cm sowie eine Referenzbrühmenge von 1000 l/ha.
Die Aufwandmenge ist gemäss den Weisungen des BLW an das Stadium der zu behandelnden Kultur anzupassen.
- 11 Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf ein Baumvolumen von 10'000 m³ pro ha. Die Aufwandmenge ist gemäss den Weisungen des BLW an das Baumvolumen anzupassen.
- 13 SPE 3: Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 50 m zu Oberflächengewässern einhalten. Zum Schutz vor den Folgen einer Abschwemmung eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene Pufferzone von mindestens 6 m einhalten. Reduktion der Distanz aufgrund von Drift und Ausnahmen gemäss den Weisungen des BLW.
- 14 Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.
- 15 Nebenwirkung Frostspanner: nur bei Einsatz unmittelbar vor oder nach der Blüte.
- 16 2 Behandlungen im Abstand von 10-14 Tagen. 1. Behandlung kurz vor dem Farbumschlag.
- 17 Maximal 3 Behandlungen pro Kultur.
- 18 Behandlungen im Abstand von 2 Wochen.
- 20 Nur für Topf- und Containerpflanzen.
- 21 6 ml in 10 Liter Wasser auflösen und dann giessen (Brühe reicht für 100 Liter Substrat).

Anwenderschutz-Auflagen:

- 3 Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.
- 12 Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.
- 19 Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung des Mittels Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.

Auf der Packung aufzudruckende Gefahrenkennzeichnungen:

PSM-Sätze

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

- SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.