



Packungsbeilage Nr. 7165 / 2024

für Pflanzenschutzmittel gemäss Artikel 36 der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
(Pflanzenschutzmittelverordnung, SR 916.161).

Produkteigenschaften

Sachbezeichnung:	Herbizid
Formulierung:	EC Emulsionskonzentrat
Wirkstoffgehalt:	25.2 % Clethodim (240 g/l)
IUPAC-Name:	(+/-)-2-[(E)-1-[(E)-3-chloroallyloxyimino]propyl]-5-[2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-enone

Lagerung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist.

Entsorgung

Gebinde:	Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr.
Mittelreste:	Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Handelsprodukte

Centurion 240 Neo

Eidg. Zulassungsnummer: I-7451	Herkunftsland: Italien
Ausländische Zulassungsnummer: 16461	Ausl. Bewilligungsinhaber: Arysta Lifescience, Frankreich

Select

Eidg. Zulassungsnummer: I-6448	Herkunftsland: Italien
Ausländische Zulassungsnummer: 008796	Ausl. Bewilligungsinhaber: Arysta Lifescience, Frankreich

Bewilligte Indikationen

Anwendungsgebiet	Schadereger/Wirkung	Anwendung unter Einhaltung von	(*)
Beerenbau			
Erdbeere	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.5 l/ha Anwendung: Vor der Blüte und nach der Ernte.	1, 2, 3, 4
Erdbeere	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1 l/ha Anwendung: Vor der Blüte und nach der Ernte.	1, 3, 4, 5
Obstbau			
Kernobst	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1 l/ha	1, 3, 5
Kernobst	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.5 l/ha	1, 2, 3
Weinbau			
Reben	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1 l/ha	1, 3, 5
Reben	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.5 l/ha	1, 2, 3

Gemüsebau

Bohnen	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1 l/ha Anwendung: Nachauflauf.	1, 3, 5, 6
Bohnen	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.5 l/ha Anwendung: Nachauflauf.	1, 2, 3, 6
Erbsen ohne Hülsen	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.5 l/ha Anwendung: Stadium 12-19 (BBCH).	1, 2, 3, 7
Estragon, Lorbeer, Petersilie, Rosmarin, Salbei, Schnittlauch, Thymian	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.5 l/ha Wartefrist: 60 Tage Anwendung: Nach der Pflanzung, im Nachauflauf, nach dem Wiederaustrieb oder auf etablierten Kulturen.	1, 2, 3, 4, 8
Freiland: Süsskartoffel	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.5 l/ha Wartefrist: 60 Tage	1, 2, 3, 7, 8
Karotten	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1 l/ha Wartefrist: 8 Woche(n) Anwendung: Nachauflauf.	1, 3, 5
Karotten	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.5 l/ha Wartefrist: 8 Woche(n) Anwendung: Nachauflauf.	1, 2, 3
Kopfkohle	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1 l/ha Wartefrist: 4 Woche(n) Anwendung: Nachauflauf.	1, 3, 5
Kopfkohle	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.5 l/ha Wartefrist: 4 Woche(n) Anwendung: Nachauflauf.	1, 2, 3
Lauch	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1 l/ha Wartefrist: 4 Woche(n) Anwendung: Nachauflauf.	1, 3, 5
Lauch	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.5 l/ha Wartefrist: 4 Woche(n) Anwendung: Nachauflauf.	1, 2, 3
Meerrettich	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.4 l/ha Wartefrist: 40 Tage Anwendung: Stadium 12-19 (BBCH).	1, 2, 3, 7, 8, 9
Meerrettich	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1 l/ha Wartefrist: 40 Tage Anwendung: Stadium 12-19 (BBCH).	1, 3, 5, 7, 8, 9
Pastinake	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1 l/ha Wartefrist: 40 Tage Anwendung: Stadium 12-19 (BBCH).	1, 3, 5, 7, 8
Pastinake	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.5 l/ha Wartefrist: 40 Tage Anwendung: Stadium 12-19 (BBCH).	1, 2, 3, 7, 8
Rande	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.5 l/ha Wartefrist: 60 Tage Anwendung: Nach dem Auflaufen.	1, 2, 3, 7, 8
Rande	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1 l/ha Wartefrist: 60 Tage Anwendung: Nach dem Auflaufen.	1, 3, 5, 7, 8
Rettich	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1 l/ha Wartefrist: 40 Tage Anwendung: Stadium 12-19 (BBCH).	1, 3, 5, 7, 8
Rettich	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.4 l/ha Wartefrist: 40 Tage Anwendung: Stadium 12-19 (BBCH).	1, 2, 3, 7, 8
Schalotten	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.4 l/ha Wartefrist: 56 Tage Anwendung: Stadium 12-18 (BBCH).	1, 2, 3, 7, 8
Schalotten	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1 l/ha Wartefrist: 56 Tage Anwendung: Stadium 12 (BBCH).	1, 3, 5, 7, 8
Schwarzwurzel	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.5 l/ha Anwendung: Im 1- bis 2-Blattstadium der Kultur.	1, 2, 3, 7, 8
Spargel [Ertragsanlagen]	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.75 l/ha Anwendung: Nach der Stechperiode (BBCH 12 bis 19).	1, 3, 5, 8, 10, 11
Spargel [Junganlagen]	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.75 l/ha Anwendung: Ab Pflanzjahr (BBCH 12 bis 19).	1, 3, 5, 8, 10, 11
Speisekohlrüben	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1 l/ha Wartefrist: 40 Tage Anwendung: Stadium 12-19 (BBCH).	1, 3, 5, 7, 8
Speisekohlrüben	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.4 l/ha Wartefrist: 40 Tage Anwendung: Stadium 12-19 (BBCH).	1, 2, 3, 7, 8

Tomaten, Zwiebeln	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.5 l/ha Wartefrist: 8 Woche(n) Anwendung: Nachauflauf.	1, 2, 3
Tomaten, Zwiebeln	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1 l/ha Wartefrist: 8 Woche(n) Anwendung: Nachauflauf.	1, 3, 5
Wurzelpetersilie	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1 l/ha Wartefrist: 40 Tage Anwendung: Stadium 12-19 (BBCH).	1, 3, 5, 7, 8, 9
Wurzelpetersilie	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.5 l/ha Wartefrist: 40 Tage Anwendung: Stadium 12-19 (BBCH).	1, 2, 3, 7, 8, 9
Feldbau			
Eiweisserbse, Raps, Sojabohne, Sonnenblume	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.5 l/ha	1, 2, 3, 7
Futter- und Zuckerrüben, Kartoffeln	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.5 l/ha	1, 2, 3
Futter- und Zuckerrüben, Kartoffeln	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1 l/ha	1, 3, 5
Klee zur Saatgutproduktion	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.75 l/ha	1, 3, 5, 7, 8
Lein	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1 l/ha	1, 3, 5, 8
Lein	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.5 l/ha	1, 2, 3, 8
Mohn	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.5 l/ha	1, 2, 3, 7, 8
Sonnenblume	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1 l/ha	1, 3, 5, 7
Tabak	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.5 l/ha Anwendung: Unmittelbar nach der Pflanzung.	1, 2, 3, 7, 8
Zierpflanzen			
Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst) [in Baumschulen]	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.5 l/ha	1, 2, 3, 8, 10, 11

Allgemeine / Agronomische Auflagen:

- 1 Keine Anwendung zusammen mit einem Sojalecithin-haltigen Haft- oder Netzmittel.
- 2 SPe 3: Zum Schutz von Nichtzielpflanzen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 6 m zu Biotopen (gemäss Art. 18a und 18b NHG) einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle reduziert werden.
- 4 Maximal 1 Behandlung pro Kultur und Jahr.
- 5 SPe 3: Zum Schutz von Nichtzielpflanzen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 20 m zu Biotopen (gemäss Art. 18a und 18b NHG) einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle reduziert werden.
- 6 Letzte Behandlung vor der Blüte.
- 7 Maximal 1 Behandlung pro Kultur.
- 8 Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).
- 9 Um mögliche Phytotoxizitätsprobleme vorzubeugen, wird empfohlen, eine Versuchsspritzung durchzuführen, bevor das ganze Feld behandelt wird.
- 10 Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.
- 11 Anwendungstechnik: Unterblattbehandlung.

Anwenderschutz-Auflagen:

- 3 Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzbrille oder Visier tragen.

Auf der Packung aufzudruckende Gefahrenkennzeichnungen:

PSM-Sätze

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
- SPe 2 Zum Schutz von Grundwasser nicht in Grundwasserschutzzonen (S2 und Sh) ausbringen.