



Packungsbeilage Nr. 7358 / 2019

für Pflanzenschutzmittel gemäss Artikel 36 der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln

(Pflanzenschutzmittelverordnung, SR 916.161).

Produkteigenschaften

Sachbezeichnung:	Herbizid
Formulierung:	SL Wasserlösliches Konzentrat
Wirkstoffgehalt:	37.6 % Glyphosat (450 g/l) [als 50.8% Glyphosat-isopropylammoniumsalz (607 g / l)]
IUPAC-Name:	N-(phosphonomethyl)glycine

Lagerung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist.

Entsorgung

Gebinde:	Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr.
Mittelreste:	Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Handelsprodukte

Bewilligte Indikationen

Anwendungsgebiet	Schaderegner/Wirkung	Anwendung unter Einhaltung von	(*)
Beerenbau			
Brombeere	Mehrfährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährig Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 7.5 l/ha	1, 2, 3, 4
Brombeere	Einjährig Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährig Monocotyledonen (Ungräser), Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1.5 - 2.5 l/ha	1, 2, 3, 4
Obstbau			
Kernobst, Steinobst	Mehrfährig Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährig Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 7.5 l/ha	1, 2, 3, 4
Kernobst, Steinobst	Einjährig Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährig Monocotyledonen (Ungräser), Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1.5 - 2.5 l/ha	1, 2, 3, 4
Weinbau			
Ertragsreben	Mehrfährig Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährig Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 7.5 l/ha	1, 2, 3, 4
Ertragsreben	Einjährig Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährig Monocotyledonen (Ungräser), Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1.5 - 2.5 l/ha	1, 2, 3, 4
Gemüsebau			
Brache	Einjährig Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährig Monocotyledonen (Ungräser), Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1.5 - 2.5 l/ha	1, 3, 4, 5
Brache	Mehrfährig Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährig Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 7.5 l/ha	1, 3, 4, 5

Feldbau

Brache	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser), Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1.5 - 2.5 l/ha	1, 3, 4, 5
Brache	Mehrfährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 7.5 l/ha	1, 3, 4, 5
Mais	Mehrfährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 7.5 l/ha	1, 3, 4, 6, 7
Mais	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser), Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1.5 - 2.5 l/ha	1, 3, 4, 6, 7
Wiesen und Weiden	Dicotyledonen (Unkräuter), Monocotyledonen (Ungräser)	Konzentration: 0.5 - 1 % Anwendung: Einzelpflanzenbehandlung mit Rückenspritze.	1, 3, 4, 8
Wiesen und Weiden	Dicotyledonen (Unkräuter), Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 7.5 l/ha Anwendung: Flächenbehandlung; vor Neuansaat.	1, 3, 4, 5
Wiesen und Weiden	Dicotyledonen (Unkräuter), Monocotyledonen (Ungräser)	Konzentration: 5 - 7.5 % Anwendung: Einzelpflanzenbehandlung mit Handspritze, Handdochtgerät.	1, 3, 4, 8

Zierpflanzen

Brache	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser), Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1.5 - 2.5 l/ha	1, 3, 4, 5
Brache	Mehrfährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 7.5 l/ha	1, 3, 4, 5
Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst), Rosen	Mehrfährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 7.5 l/ha	1, 2, 3, 4
Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst), Rosen	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser), Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1.5 - 2.5 l/ha	1, 2, 3, 4

Forstwirtschaft

Forstliche Pflanzgärten	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser), Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 1.5 - 2.5 l/ha	1, 2, 3, 4
Forstliche Pflanzgärten	Mehrfährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 7.5 l/ha	1, 2, 3, 4

Biodiversitätsförderflächen (BFF) gemäss DZV

Grünfläche	Ackerkratzdistel, Stumpfbblätteriger Ampfer (Blacken)	Konzentration: 5 - 7.5 % Anwendung: Mit Handspritzgeräten (ohne Rückenspritze).	1, 3, 4, 8, 9
Grünfläche	Ackerkratzdistel, Stumpfbblätteriger Ampfer (Blacken)	Konzentration: 0.5 - 1 % Anwendung: Mit Rückenspritze.	1, 3, 4, 8, 9
Offene Ackerfläche	Ackerkratzdistel, Gemeine Quecke, Stumpfbblätteriger Ampfer (Blacken), Winden	Konzentration: 5 - 7.5 % Anwendung: Mit Handspritzgeräten (ohne Rückenspritze).	1, 3, 4, 9
Offene Ackerfläche	Ackerkratzdistel, Gemeine Quecke, Stumpfbblätteriger Ampfer (Blacken), Winden	Konzentration: 0.5 - 1 % Anwendung: Mit Rückenspritze.	1, 3, 4, 9

Allgemeine / Agronomische Auflagen:

- 2 Behandlung spätestens bis Ende August. Es dürfen keine grünen Pflanzenteile und keine Reben mit niederen Schnitssystemen (Gobelets und tiefe Cordons usw.) behandelt werden.
- 4 Keine Niederschläge während mindestens 6 Stunden nach der Behandlung.
- 5 Behandlung bis spätestens 2 Wochen vor der Saat oder Pflanzung.
- 6 Die Aufwandmenge bezieht sich auf die effektiv zu behandelnde Fläche.
- 7 Behandlung der unbearbeiteten Zwischenreihen bei der Streifenfrässaat.
- 8 Beweidung oder Schnitt (Grünfutter oder Konservierung) frühestens 3 Wochen nach der Behandlung. Ausnahme: Für nicht laktierende Tiere beträgt die Wartefrist 2 Wochen.
- 9 Einzelpflanzenbehandlung gemäss Direktzahlungsverordnung (DZV).

Anwenderschutz-Auflagen:

- 1 Beim Gebrauch einer Hand- oder Rückenspritze sind beim Ansetzen der Spritzbrühe Schutzhandschuhe zu tragen.
- 3 Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzbrille oder Visier tragen.

Auf der Packung aufzudruckende Gefahrenkennzeichnungen:

PSM-Sätze

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.