



Packungsbeilage Nr. 7575 / 2023

für Pflanzenschutzmittel gemäss Artikel 36 der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln

(Pflanzenschutzmittelverordnung, SR 916.161).

Produkteigenschaften

Sachbezeichnung:	Fungizid
Formulierung:	SL Wasserlösliches Konzentrat
Wirkstoffgehalt:	51.7 % Kaliumphosphonat (755 g/l)
IUPAC-Name:	KH ₂ PO ₃ und K ₂ HPO ₃

Lagerung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist.

Entsorgung

Gebinde:	Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr.
Mittelreste:	Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Handelsprodukte

LBG-01F34

Eidg. Zulassungsnummer: F-6717

Herkunftsland: Frankreich

Ausländische Zulassungsnummer: 2100041

Ausl. Bewilligungsinhaber: Luxembourg Pamol (Cyprus) LTD., Zypern

Bewilligte Indikationen

Anwendungsgebiet	Schaderreger/Wirkung	Anwendung unter Einhaltung von	(*)
Beerenbau			
Brombeere	Falscher Mehltau der Brombeere	Konzentration: 0.4 % Aufwandmenge: 4 l/ha Wartefrist: 3 Woche(n) Anwendung: Spritzapplikation.	1, 2, 3, 4
Erdbeere	Teilwirkung: Lederfäule der Erdbeeren	Konzentration: 0.5 % Aufwandmenge: 5 l/ha Wartefrist: 3 Woche(n) Anwendung: Spritzapplikation.	5, 6
Erdbeere	Lederfäule der Erdbeeren, Rhizomfäule der Erdbeeren, Rote Wurzelfäule der Erdbeeren	Aufwandmenge: 5 l/ha Anwendung: Vor der Blüte und nach der Ernte., Giessen.	5
Himbeere	Wurzelsterben der Himbeere	Konzentration: 0.4 % Aufwandmenge: 4 l/ha Anwendung: Vor der Blüte oder nach der Ernte., Giessen oder spritzen.	1, 2, 3, 7
Obstbau			
Apfel, Birne / Nashi	Teilwirkung: Lagerschorf des Kernobstes	Konzentration: 0.2 % Aufwandmenge: 3.2 l/ha Wartefrist: 2 Woche(n) Anwendung: Spritzapplikation., Ab Stadium 76-89 (BBCH) bis 2 Wochen vor der Ernte.	8, 9

Apfel, Birne / Nashi	Teilwirkung: Schorf des Kernobstes	Konzentration: 0.2 % Aufwandmenge: 3.2 l/ha Wartefrist: 2 Woche(n) Anwendung: Ab Austrieb., Spritzapplikation.	8, 9
Weinbau			
Reben	Teilwirkung: Falscher Mehltau der Rebe	Konzentration: 0.2 % Aufwandmenge: 3.2 l/ha Anwendung: Vor- und Nachblütebehandlungen bis spätestens Mitte August., Spritzapplikation.	9, 10, 11
Gemüsebau			
Artischocken	Falscher Mehltau der Artischocke	Aufwandmenge: 3.5 l/ha Wartefrist: 3 Woche(n) Anwendung: Spritzapplikation.	3, 12
Aubergine	Falscher Mehltau der Aubergine	Aufwandmenge: 4 l/ha Wartefrist: 15 Tage Anwendung: Spritzapplikation.	3, 13
Baby-Leaf (Asteraceae)	Falscher Mehltau des Salats	Aufwandmenge: 3 l/ha Wartefrist: 14 Tage Anwendung: Spritzapplikation.	2, 14
Chicorée	Falscher Mehltau des Salats, Pythium spp.	Aufwandmenge: 3.5 l/ha Wartefrist: 15 Tage Anwendung: Spritzapplikation.	3, 14
Gurken	Falscher Mehltau der Kürbisgewächse	Konzentration: 0.35 % Aufwandmenge: 3.5 l/ha Wartefrist: 15 Tage Anwendung: Bei Befallsgefahr., Spritzapplikation.	3, 12
Paprika	Falscher Mehltau der Paprika	Aufwandmenge: 4 l/ha Wartefrist: 15 Tage Anwendung: Spritzapplikation.	3, 13
Salate (Asteraceae)	Falscher Mehltau des Salats	Aufwandmenge: 3 l/ha Wartefrist: 14 Tage Anwendung: Spritzapplikation.	2, 14
Speisekürbisse (ungeniessbare Schale)	Falscher Mehltau der Kürbisgewächse	Aufwandmenge: 3.5 l/ha Wartefrist: 15 Tage Anwendung: Spritzapplikation.	3, 12
Zierpflanzen			
Blumenkulturen und Grünpflanzen	Falsche Mehltapilze der Zierpflanzen	Konzentration: 0.5 % Anwendung: Spritzapplikation.	15
Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst)	Teilwirkung: Krankheiten durch pathogene Bodenpilze	Aufwandmenge: 5 l/ha Anwendung: Giessen.	9, 16

Allgemeine / Agronomische Auflagen:

- 1 Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
- 2 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.
- 3 Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).
- 4 Für Brombeeren bezieht sich die angegebene Aufwandmenge auf Stadium "Erste Blüten bis etwa 50% der Blüten offen" sowie eine Referenzbrühmenge von 1000 l/ha. Die Aufwandmenge ist gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle an das Stadium der zu behandelnden Kultur anzupassen.
- 5 Maximal insgesamt 3 Spritz- und Giessbehandlungen pro Kultur und Jahr.
- 6 Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf Stadium "Vollblüte bis Beginn Rotfärbung der Früchte", 4 Pflanzen pro m² sowie eine Referenzbrühmenge von 1000 l/ha. Die Aufwandmenge ist gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle an das Stadium der zu behandelnden Kultur anzupassen.
- 7 Für Sommerhimbeeren bezieht sich die angegebene Aufwandmenge auf Stadium "Erste Blüten bis etwa 50% der Blüten offen" sowie eine Referenzbrühmenge von 1000 l/ha. Für Herbsthimbeeren bezieht sich die Aufwandmenge auf eine Heckenhöhe von 150 - 170 cm sowie eine Referenzbrühmenge von 1000 l/ha. Die Aufwandmenge ist gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle an das Stadium der zu behandelnden Kultur anzupassen.
- 8 Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf ein Baumvolumen von 10'000 m³ pro ha. Die Aufwandmenge ist gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle an das Baumvolumen anzupassen.
- 9 Maximal 6 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
- 10 Auch für die Luftapplikation.
- 11 Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf Stadium BBCH 71-81 (J-M, Nachblüte) und eine Referenzbrühmenge von 1600 l/ha (Berechnungsgrundlage) oder auf ein Laubwandvolumen von 4500 m³ pro ha. Die Aufwandmenge ist gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle an das Laubwandvolumen anzupassen.
- 12 Maximal 3 Behandlungen pro Kultur.
- 13 Maximal 5 Behandlungen pro Kultur.
- 14 Maximal 4 Behandlungen pro Kultur.
- 15 Maximal 6 Behandlungen pro Kultur und Jahr.
- 16 1. Behandlung bei der Pflanzung.

Auf der Packung aufzudruckende Gefahrenkennzeichnungen:
PSM-Sätze

Bewilligt für die nichtberufliche Verwendung.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.