



Packungsbeilage Nr. 7900 / 2024

für Pflanzenschutzmittel gemäss Artikel 36 der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
(Pflanzenschutzmittelverordnung, SR 916.161).

Produkteigenschaften

Sachbezeichnung:	Fungizid
Formulierung:	EC Emulsionskonzentrat
Wirkstoffgehalt:	15 % Prothioconazole (150 g/l); 7.5 % Bixafen (75 g/l)
IUPAC-Name:	(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione; N-(3',4'-dichloro-5-fluorobiphenyl-2-yl)-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide

Lagerung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist.

Entsorgung

Gebinde:	Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr.
Mittelreste:	Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Handelsprodukte

Saintex

Eidg. Zulassungsnummer: F-6421	Herkunftsland: Frankreich
Ausländische Zulassungsnummer: 2130017	Ausl. Bewilligungsinhaber: HMWC SARL, Frankreich

Proxafen

Eidg. Zulassungsnummer: D-7449	Herkunftsland: Deutschland
Ausländische Zulassungsnummer: 026764-00/015	Ausl. Bewilligungsinhaber: Agrimotion Deutschland GmbH, Deutschland

Aviator Xpro

Eidg. Zulassungsnummer: D-6892	Herkunftsland: Deutschland
Ausländische Zulassungsnummer: 026764-00/011	Ausl. Bewilligungsinhaber: STAR Agro Handels GmbH, Österreich

Bewilligte Indikationen

Anwendungsgebiet	Schaderreger/Wirkung	Anwendung unter Einhaltung von	(*)
Feldbau			
Gerste	Echter Mehltau des Getreides, Netzfleckenkrankheit der Gerste, Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit, Spreitelnekrosen (PLS+RCC), Zwergrost der Gerste	Aufwandmenge: 1 l/ha Anwendung: Stadium 31-51 (BBCH).	1, 2, 3, 4
Hartweizen	Braunrost, Echter Mehltau des Getreides, Septoria-Blattdürre (S. tritici oder S. nodorum)	Aufwandmenge: 1.25 l/ha Anwendung: Stadium 31-61 (BBCH).	1, 2, 3
Korn (Dinkel)	Braunrost, Echter Mehltau des Getreides, Septoria-Blattdürre (S. tritici oder S. nodorum)	Aufwandmenge: 1 l/ha Anwendung: Stadium 31-61 (BBCH).	1, 2, 3
Triticale	Braunrost, Echter Mehltau des Getreides, Gelbrost, Septoria-Blattdürre (S. tritici oder S. nodorum)	Aufwandmenge: 1.25 l/ha Anwendung: Stadium 31-61 (BBCH).	1, 2, 3

Weizen	Nebenwirkung: Blattfusarium	Aufwandmenge: 1.25 l/ha Anwendung: Stadium 39-61 (BBCH).	1, 2, 3
Weizen	Braunrost, DTR-Blattfleckenkrankheit, Echter Mehltau des Getreides, Gelbrost, Septoria-Blattdürre (S. tritici oder S. nodorum), Sprenkelnekrosen (PLS)	Aufwandmenge: 1.25 l/ha Anwendung: Stadium 31-61 (BBCH).	1, 2, 3, 5
Weizen	Halmbruchkrankheit des Getreides	Aufwandmenge: 1.25 l/ha Anwendung: Stadium 30-32 (BBCH).	1, 2, 3
Winterroggen	Braunrost, Echter Mehltau des Getreides, Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit, Septoria-Blattdürre (S. tritici oder S. nodorum)	Aufwandmenge: 1.25 l/ha Anwendung: Stadium 31-61 (BBCH).	1, 2, 3

Allgemeine / Agronomische Auflagen:

- 1 Maximal 1 Behandlung pro Kultur.
- 2 SPe 3: Zum Schutz von Gewässerorganismen muss das Abschwemmungsrisiko gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle um 1 Punkt reduziert werden.
- 4 PLS+RCC = Physiological Leaf Spots und Ramularia collo-cygni.
- 5 PLS = Physiological Leaf Spots

Anwenderschutz-Auflagen:

- 3 Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille + Atemschutzmaske (A2) tragen.

Auf der Packung aufzudruckende Gefahrenkennzeichnungen:

PSM-Sätze

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.