



Packungsbeilage Nr. 8317 / 2019

für Pflanzenschutzmittel gemäss Artikel 36 der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln

(Pflanzenschutzmittelverordnung, SR 916.161).

Produkteigenschaften

Sachbezeichnung:	Herbizid
Formulierung:	SL Wasserlösliches Konzentrat
Wirkstoffgehalt:	35.74 % Glyphosat (480 g/l) [als 43.78% Glyphosat-Kalium (588 g/l)]
IUPAC-Name:	N-(phosphonomethyl)glycine

Lagerung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist.

Entsorgung

Gebinde:	Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr.
Mittelreste:	Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Handelsprodukte

Bewilligte Indikationen

Anwendungsgebiet	Schaderegner/Wirkung	Anwendung unter Einhaltung von	(*)
Beerenbau			
Brombeere	Mehrkjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 7.5 l/ha	1, 2, 3
Brombeere	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 2.25 - 3 l/ha	1, 2, 3
Brombeere	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 - 2.25 l/ha	1, 2, 3
Obstbau			
Kernobst, Steinobst	Mehrkjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 7.5 l/ha Anwendung: Ab 2. Standjahr.	1, 2, 3
Kernobst, Steinobst	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 2.25 - 3 l/ha Anwendung: Ab 2. Standjahr.	1, 2, 3
Kernobst, Steinobst	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 - 2.25 l/ha Anwendung: Ab 2. Standjahr.	1, 2, 3
Weinbau			
Ertragsreben	Mehrkjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 7.5 l/ha	1, 2, 3
Ertragsreben	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 - 2.25 l/ha	1, 2, 3
Ertragsreben	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 2.25 - 3 l/ha	1, 2, 3
Gemüsebau			
Brache	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 2.5 - 3 l/ha	2, 3, 4

Brache	Mehrfährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 7.5 l/ha	2, 3, 4
Brache	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 - 2.25 l/ha	2, 3, 5
Feldbau			
Brache	Mehrfährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 7.5 l/ha	2, 3, 4
Brache	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 2.25 - 3 l/ha	2, 3, 4
Brache	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 - 2.25 l/ha	2, 3, 5
Frässaaten, Mulchsaaten	Mehrfährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 7.5 l/ha	2, 3
Frässaaten, Mulchsaaten	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 2.25 - 3 l/ha	2, 3
Frässaaten, Mulchsaaten	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 - 2.25 l/ha	2, 3
Wiesen und Weiden	Dicotyledonen (Unkräuter), Monocotyledonen (Ungräser)	Konzentration: 5 - 7.5 % Anwendung: Mit Handspritzgeräten.	2, 3, 6, 7
Wiesen und Weiden	Dicotyledonen (Unkräuter), Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 7.5 l/ha Anwendung: Flächenbehandlung; vor Neuansaat.	2, 3, 4
Wiesen und Weiden	Dicotyledonen (Unkräuter), Monocotyledonen (Ungräser)	Konzentration: 0.5 - 1 % Anwendung: Mit Rückenspritze.	2, 3, 6, 7
Zierpflanzen			
Brache	Mehrfährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 7.5 l/ha	2, 3, 4
Brache	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 - 2.25 l/ha	2, 3, 5
Brache	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 2.25 - 3 l/ha	2, 3, 4
Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst)	Mehrfährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 7.5 l/ha	1, 2, 3
Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst)	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 2.25 - 3 l/ha	1, 2, 3
Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst)	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 - 2.25 l/ha	1, 2, 3
Forstwirtschaft			
Forstliche Pflanzgärten	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 2.25 - 3 l/ha	1, 2, 3
Forstliche Pflanzgärten	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 - 2.25 l/ha	1, 2, 3
Forstliche Pflanzgärten	Mehrfährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 7.5 l/ha	1, 2, 3
Nichtkulturland			
Auf und an National- und Kantonsstrassen	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 2.25 - 3 l/ha Anwendung: Mit Rückenspritze.	2, 3, 8
Auf und an National- und Kantonsstrassen	Mehrfährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 7.5 l/ha Anwendung: Mit Rückenspritze.	2, 3, 8
Auf und an National- und Kantonsstrassen	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 - 2.25 l/ha Anwendung: Mit Rückenspritze.	2, 3, 8
Böschungen und Grünstreifen entlang von Verkehrswegen (gem. ChemRRV)	Gemeine Quecke	Aufwandmenge: 2.25 - 3 l/ha Anwendung: Mit Rückenspritze.	2, 3, 9
Böschungen und Grünstreifen entlang von Verkehrswegen (gem. ChemRRV)	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 - 2.25 l/ha Anwendung: Mit Rückenspritze.	2, 3, 9
Böschungen und Grünstreifen entlang von Verkehrswegen (gem. ChemRRV)	Mehrfährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 - 7.5 l/ha Anwendung: Mit Rückenspritze.	2, 3, 9
Biodiversitätsförderflächen (BFF) gemäss DZV			
Grünfläche	Ackerkratzdistel, Stumpfblättriger Ampfer (Blacken)	Konzentration: 5 - 7.5 % Anwendung: Mit Handspritzgeräten (ohne Rückenspritze).	2, 3, 7, 10
Offene Ackerfläche	Ackerkratzdistel, Gemeine Quecke, Stumpfblättriger Ampfer (Blacken), Winden	Konzentration: 5 - 7.5 % Anwendung: Mit Handspritzgeräten (ohne Rückenspritze).	2, 3, 10

Allgemeine / Agronomische Auflagen:

- 1 Behandlung spätestens bis Ende August. Es dürfen keine grünen Pflanzenteile und keine Reben mit niederen Schnitssystemen (Gobelets und tiefe Cordons usw.) behandelt werden.

- 2 Keine Niederschläge während mindestens einer Stunde nach der Behandlung.
- 4 Notwendige Wartezeit bis zur nachfolgenden Bodenbearbeitung oder Saat: 4 Tage.
- 5 Notwendige Wartezeit bis zur nachfolgenden Bodenbearbeitung oder Saat: 6 Stunden.
- 6 Einzelpflanzenbehandlung.
- 7 Beweidung oder Schnitt (Grünfutter oder Konservierung) frühestens 3 Wochen nach der Behandlung. Ausnahme: Für nicht laktierende Tiere beträgt die Wartezeit 2 Wochen.
- 8 Gemäss Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV, Anhang 2.5): Nur Einzelpflanzenbehandlung anderweitig nicht bekämpfbarer Problempflanzen bei National- und Kantonsstrassen.
- 9 Gemäss Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV, Anhang 2.5): Nur Einzelpflanzenbehandlung anderweitig nicht bekämpfbarer Problempflanzen auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen.
- 10 Einzelpflanzenbehandlung gemäss Direktzahlungsverordnung (DZV).

Anwenderschutz-Auflagen:

- 3 Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe tragen.

Auf der Packung aufzudruckende Gefahrenkennzeichnungen:

PSM-Sätze

- Bewilligt für die nichtberufliche Verwendung.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.