



Packungsbeilage Nr. 7890 / 2019

für Pflanzenschutzmittel gemäss Artikel 36 der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln

(Pflanzenschutzmittelverordnung, SR 916.161).

Produkteigenschaften

Sachbezeichnung:	Stimulator der natürlichen Abwehrkräfte
Formulierung:	SL Wasserlösliches Konzentrat
Wirkstoffgehalt:	4.3 % Laminarin (45 g/l)
IUPAC-Name:	(1->3)-beta-D-glucan

Lagerung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist.

Entsorgung

Gebinde:	Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr.
Mittelreste:	Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Handelsprodukte

Bewilligte Indikationen

Anwendungsgebiet	Schaderreger/Wirkung	Anwendung unter Einhaltung von	(*)
Beerenbau			
Erdbeere	Echter Mehltau der Erdbeere	Konzentration: 0.1 % Aufwandmenge: 1 l/ha	1, 2
Erdbeere	Teilwirkung: Graufäule (Botrytis cinerea)	Konzentration: 0.1 % Aufwandmenge: 1 l/ha Anwendung: Während der Blüte.	1, 3
Obstbau			
Kernobst	Teilwirkung: Echter Mehltau des Apfels/der Birne, Lentizellenfäulnis des Apfels, Schorf des Kernobstes	Konzentration: 0.0625 % Aufwandmenge: 1 l/ha Wartefrist: 3 Tage	4, 5
Kernobst	Teilwirkung: Feuerbrand	Konzentration: 0.047 % Aufwandmenge: 0.75 l/ha Anwendung: Stadium 56-69 (BBCH).	5, 6
Kernobst	Teilwirkung: Feuerbrand	Konzentration: 0.075 % Anwendung: Stadium 56-69 (BBCH).	6, 7, 8
Weinbau			
Reben	Teilwirkung: Echter Mehltau der Rebe	Konzentration: 0.125 % Aufwandmenge: 2 l/ha Anwendung: Vor- und Nachblütebehandlungen bis spätestens Mitte August.	9, 10
Gemüsebau			
Baby-Leaf (Asteraceae)	Falscher Mehltau des Salats	Aufwandmenge: 1 l/ha Wartefrist: 3 Tage	

Kürbisgewächse (Cucurbitaceae)	Falscher Mehltau der Kürbisgewächse, Graufäule (Botrytis cinerea)	Aufwandmenge: 3 l/ha Wartefrist: 3 Tage
Salate (Asteraceae)	Falscher Mehltau des Salats	Aufwandmenge: 1 l/ha Wartefrist: 3 Tage
Tomaten	Bakterielle Fleckenkrankheit, Echter Mehltau der Solanaceae, Graufäule (Botrytis cinerea)	Aufwandmenge: 1 l/ha Wartefrist: 3 Tage

Allgemeine / Agronomische Auflagen:

- 1 Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf Stadium "Vollblüte bis Beginn Rotfärbung der Früchte", 4 Pflanzen pro m² sowie eine Referenzbrühmenge von 1000 l/ha.
- 2 Erste Behandlung vor Befallsbeginn. Behandlung im Abstand von 7-10 Tagen wiederholen.
- 3 Maximal 4 Behandlungen.
- 4 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.
- 5 Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf ein Baumvolumen von 10'000 m³ pro ha.
- 6 Behandlung alle 10 Tage wiederholen.
- 7 Beim Einsatz in Hochstammkulturen.
- 8 Brühmenge 20 - 30 l/Baum (75 ml Vacciplant / 100 l Wasser).
- 9 Auch für die Luftapplikation.
- 10 Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf Stadium BBCH 71-81 (J-M, Nachblüte) und eine Referenzbrühmenge von 1600 l/ha (Berechnungsgrundlage) oder auf ein Laubwandvolumen von 4500 m³ pro ha.

Auf der Packung aufzudruckende Gefahrenkennzeichnungen:

PSM-Sätze

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.