



Packungsbeilage Nr. 7794 / 2019

für Pflanzenschutzmittel gemäss Artikel 36 der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln

(Pflanzenschutzmittelverordnung, SR 916.161).

Produkteigenschaften

Sachbezeichnung:	Fungizid
Formulierung:	SC Suspensionskonzentrat
Wirkstoffgehalt:	20.8 % Boscalid (233 g/l); 6 % Epoxiconazole (67 g/l)
IUPAC-Name:	2-Chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide; (2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)oxiran-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole

Lagerung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist.

Entsorgung

Gebinde:	Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr.
Mittelreste:	Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Handelsprodukte

Bell

Eidg. Zulassungsnummer: F-6125	Herkunftsland: Frankreich
Ausländische Zulassungsnummer: 2060120	Ausl. Bewilligungsinhaber: BASF Agro SAS, Frankreich

Bewilligte Indikationen

Anwendungsgebiet	Schaderreger/Wirkung	Anwendung unter Einhaltung von	(*)
Feldbau			
Gerste	Echter Mehltau des Getreides, Netzfleckenkrankheit der Gerste, Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit, Sprenkelnekrosen (PLS+RCC), Zwergrost der Gerste	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Anwendung: Stadium 31-51 (BBCH).	1, 2
Korn (Dinkel)	Braunrost	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Anwendung: Stadium 37-61 (BBCH).	1, 2
Korn (Dinkel), Triticale, Weizen	Echter Mehltau des Getreides, Gelbrost	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Anwendung: Stadium 31-61 (BBCH).	1, 2
Korn (Dinkel), Triticale, Weizen, Winterroggen	Septoria-Blattdürre (S. tritici oder S. nodorum), Septoria-Spelzenbräune (S. nodorum)	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Anwendung: Stadium 37-61 (BBCH).	1, 2
Triticale, Weizen, Winterroggen	Halmbruchkrankheit des Getreides	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Anwendung: Stadium 30-32 (BBCH).	1, 2
Triticale, Winterroggen	Braunrost, Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Anwendung: Stadium 37-61 (BBCH).	1, 2
Weizen	Braunrost, DTR-Blattfleckenkrankheit	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Anwendung: Stadium 37-61 (BBCH).	1, 2

Allgemeine / Agronomische Auflagen:

- 1 Maximal 1 Behandlung pro Kultur.

Anwenderschutz-Auflagen:

- 2 Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen.
Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.
Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.

Auf der Packung aufzudruckende Gefahrenkennzeichnungen:**PSM-Sätze**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

- SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.