



Packungsbeilage Nr. 8217 / 2019

für Pflanzenschutzmittel gemäss Artikel 36 der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln

(Pflanzenschutzmittelverordnung, SR 916.161).

Produkteigenschaften

Sachbezeichnung:	Fungizid
Formulierung:	EC Emulsionskonzentrat
Wirkstoffgehalt:	6 % Fluxapyroxad (62.5 g/l); 6 % Epoxiconazole (62.5 g/l)
IUPAC-Name:	3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluorobiphenyl-2-yl)pyrazole-4-carboxamide; (2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluoro-phenyl)oxiran-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole

Lagerung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist.

Entsorgung

Gebinde:	Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr.
Mittelreste:	Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Handelsprodukte

Epoxiconazol + Fluxapyroxad

Eidg. Zulassungsnummer: D-6153	Herkunftsland: Deutschland
Ausländische Zulassungsnummer: GP 026958-00/017	Ausl. Bewilligungsinhaber: Bernbeck LLP, Vereinigtes Königreich

Raxeda

Eidg. Zulassungsnummer: F-6436	Herkunftsland: Frankreich
Ausländische Zulassungsnummer: 2130032	Ausl. Bewilligungsinhaber: HMWC SARL, Frankreich

Adexar

Eidg. Zulassungsnummer: A-5551	Herkunftsland: Österreich
Ausländische Zulassungsnummer: 3151/0	Ausl. Bewilligungsinhaber: BASF AG, Deutschland

Adexar

Eidg. Zulassungsnummer: I-5550	Herkunftsland: Italien
Ausländische Zulassungsnummer: 15137	Ausl. Bewilligungsinhaber: BASF AG, Deutschland

Adexar

Eidg. Zulassungsnummer: F-5549	Herkunftsland: Frankreich
Ausländische Zulassungsnummer: 2110170	Ausl. Bewilligungsinhaber: BASF Agro SAS, Frankreich

Adexar

Eidg. Zulassungsnummer: D-5548	Herkunftsland: Deutschland
Ausländische Zulassungsnummer: 006958-00	Ausl. Bewilligungsinhaber: BASF AG, Deutschland

Bewilligte Indikationen

Anwendungsgebiet	Schaderreger/Wirkung	Anwendung unter Einhaltung von	(*)
Feldbau			
Gerste	Echter Mehltau des Getreides, Netzfleckenkrankheit der Gerste, Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit, Sprenkelnekrosen (PLS+RCC), Zwergrost der Gerste	Aufwandmenge: 2 l/ha Anwendung: Stadium 31-51 (BBCH).	1, 2
Triticale	Braunrost, Echter Mehltau des Getreides, Septoria-Blattdürre (S. tritici oder S. nodorum)	Aufwandmenge: 2 l/ha Anwendung: Stadium 31-61 (BBCH).	1, 2
Triticale, Weizen, Winterroggen	Halmbruchkrankheit des Getreides	Aufwandmenge: 2 l/ha Anwendung: Stadium 30-32 (BBCH).	1, 2
Weizen	Braunrost, DTR-Blattfleckenkrankheit, Echter Mehltau des Getreides, Gelbrost, Septoria-Blattdürre (S. tritici oder S. nodorum), Septoria-Spelzenbräune (S. nodorum)	Aufwandmenge: 2 l/ha Anwendung: Stadium 31-61 (BBCH).	1, 2
Winterroggen	Braunrost, Echter Mehltau des Getreides, Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit	Aufwandmenge: 2 l/ha Anwendung: Stadium 31-61 (BBCH).	1, 2

Allgemeine / Agronomische Auflagen:

- 2 SPa 1: Zur Vermeidung einer Resistenzbildung dürfen Pflanzenschutzmittel mit einem Wirkstoff der Gruppe der SDHI (succinate dehydrogenase inhibitors) nicht mehr als 1 mal pro Kultur ausgebracht werden.

Anwenderschutz-Auflagen:

- 1 Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen.
Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.
Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.

Auf der Packung aufzudruckende Gefahrenkennzeichnungen:

PSM-Sätze

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.