



Packungsbeilage Nr. 6982 / 2022

für Pflanzenschutzmittel gemäss Artikel 36 der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
(Pflanzenschutzmittelverordnung, SR 916.161).

Produkteigenschaften

Sachbezeichnung:	Herbizid
Formulierung:	WP Wasserdispergierbares Pulver
Wirkstoffgehalt:	50 % Flumioxazin
IUPAC-Name:	7-fluoro-6-[(3,4,5,6-tetrahydro)phtalimido]-4-(2-propynyl)-1,4-benzoxazon-3(2H)-one

Lagerung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist.

Entsorgung

Gebinde:	Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr.
Mittelreste:	Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Handelsprodukte

Pledge

Eidg. Zulassungsnummer: F-6103	Herkunftsland: Frankreich
Ausländische Zulassungsnummer: 9400280	Ausl. Bewilligungsinhaber: Philagro France, Frankreich

Bewilligte Indikationen

Anwendungsgebiet	Schaderreger/Wirkung	Anwendung unter Einhaltung von	(*)
Weinbau			
Ertragsreben	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser) Teilwirkung: Kanadisches Berufkraut	Aufwandmenge: 0.8 - 1 kg/ha Anwendung: Vor dem Auflaufen der Unkräuter. , Im Frühjahr.	1, 2, 3
Gemüsebau			
Rhabarber	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1 kg/ha Anwendung: Nach der Ernte.	1, 2, 4
Spargel [grün]	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.8 - 1 kg/ha Wartefrist: 4 Woche(n) Anwendung: Voraufbau.	1, 2, 5
Spargel [weiss]	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 0.8 - 1 kg/ha Wartefrist: 2 Woche(n) Anwendung: Voraufbau.	1, 2, 5
Feldbau			
Winterweizen	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 60 g/ha Anwendung: Herbst: Voraufbau bis früher Nachauflauf; Frühjahr: bis Stadium 29 (BBCH).	1, 6

Allgemeine / Agronomische Auflagen:

- 2 Der Anwender ist eingehend über die Gefahr von Schäden zu informieren. Auf Verhütungsmöglichkeiten ist hinzuweisen.
- 3 Ab 4. Standjahr.
- 4 Die Kultur darf bei der Herbizidbehandlung nicht getroffen werden. Anwendung unter Abschirmung erforderlich.
- 5 Ab 3. Standjahr.
- 6 Maximal 1 Behandlung pro Kultur.

Anwenderschutz-Auflagen:

- 1 Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.

Auf der Packung aufzudruckende Gefahrenkennzeichnungen:**PSM-Sätze**

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
- SPo 2 Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden.