



Packungsbeilage Nr. 7732 / 2019

für Pflanzenschutzmittel gemäss Artikel 36 der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
(Pflanzenschutzmittelverordnung, SR 916.161).

Produkteigenschaften

Sachbezeichnung:	Fungizid
Formulierung:	SC Suspensionskonzentrat
Wirkstoffgehalt:	22.52 % Picoxystrobin (250 g/l)
IUPAC-Name:	methyl (E)-3-methoxy-2-{2-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxymethyl]phenyl}acrylate

Lagerung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist.

Entsorgung

Gebinde:	Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr.
Mittelreste:	Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

Handelsprodukte

Acanto

Eidg. Zulassungsnummer: D-5216	Herkunftsland: Deutschland
Ausländische Zulassungsnummer: PI 024658-00/001	Ausl. Bewilligungsinhaber: Star Agro Analyse und Handels GmbH, Österreich

Bewilligt bis 31.12.2023

Anwendungsgebiet	Schaderreger/Wirkung	Anwendung unter Einhaltung von	(*)
Feldbau			
Gerste	Echter Mehltau des Getreides, Netzfleckenkrankheit der Gerste, Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit, Zwergrost der Gerste	Aufwandmenge: 1 l/ha Anwendung: Stadium 31-51 (BBCH).	1
Raps	Sclerotinia-Fäule	Aufwandmenge: 1 l/ha Anwendung: Stadium 61-65 (BBCH).	1
Triticale, Weizen	Gelbrost	Aufwandmenge: 1 l/ha Anwendung: Stadium 31-61 (BBCH).	1
Triticale, Weizen	Septoria-Spelzenbräune (S. nodorum)	Aufwandmenge: 1 l/ha Anwendung: Stadium 51-61 (BBCH).	1
Triticale, Weizen, Winterroggen	Braunrost	Aufwandmenge: 1 l/ha Anwendung: Stadium 37-61 (BBCH).	1
Triticale, Winterroggen	Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit, Septoria-Blattdürre (S. tritici oder S. nodorum)	Aufwandmenge: 1 l/ha Anwendung: Stadium 37-51 (BBCH).	1
Weizen	Echter Mehltau des Getreides	Aufwandmenge: 1 l/ha Anwendung: Stadium 31-61 (BBCH).	1
Weizen	Septoria-Blattdürre (S. tritici oder S. nodorum)	Aufwandmenge: 1 l/ha Anwendung: Stadium 37-51 (BBCH).	1

Allgemeine / Agronomische Auflagen:

- 1 Maximal 1 Behandlung pro Kultur.
- 2 In Tankmischung mit 1 - 1.5 l/ha Chlorothalonil (40% SC).
- 3 PLS = Physiological Leaf Spots

**Auf der Packung aufzudruckende Gefahrenkennzeichnungen:
PSM-Sätze**

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.